


Physiodose NaCl sól fizjologiczna 0,9%, 40 ampułek x 5 ml



Cena: 13,19 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	40 amp. po 5 ml
Producent	GLENMARK PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Wiek	bez ograniczeń wiekowych

Opis produktu

Opis

Physiodose NaCl 0,9% roztwór soli fizjologicznej w jednorazowych ampułkach. Roztwór soli fizjologicznej może być stosowany do higieny nosa, oczu, uszu, oczyszczania ran oraz do inhalacji w aerzoloterapii. Nie zawiera konserwantów. Łatwy i bezpieczny w użyciu.

Zastosowanie

U niemowląt, dzieci i dorosłych do: higieny nosa, oczu, uszu, oczyszczania ran, inhalacjach w aerzoloterapii.

Sposób użycia

- Higiena nosa: można stosować codziennie od 1 do 6 razy. Należy odchylić głowę do tyłu, następnie delikatnie umieścić końcówkę ampułki w jamie nosa i lekko ją ścisnąć i powtórzyć tak samo w drugiej dziurce. Aby umożliwić odpływ śluzu i nadmiaru płynu należy unieść głowę. Nie należy mocno wydmuchiwać nosa przez 10 minut po zastosowaniu roztworu.
- Higiena oczu: kilka kropli roztworu wpuść do każdego oka, bez dotykania ampułką powierzchni oka. Nadmiar płynu należy usunąć za pomocą gazy. Odczekaj 15 minut przed zastosowaniem jakiegokolwiek innego środka do oczu.
- Higiena uszu: przepłukaj zewnętrzny kanał słuchowy. Nadmiar płynu usuń za pomocą gazy.

w przypadku niemowląt należy uciskać ampułkę używając minimalnej siły, aby uniknąć ryzyka przedostania się płynu do ucha środkowego.

- Oczyszczanie ran: wykorzystując całą zawartość ampułki przemyj ranę bez dotykania rany. Osusz z nadmiaru płynu wyłącznie obszar wokół rany.
- Inhalacja w aerzoloterapii: jeśli preparat jest używany samodzielnie należy postąpić zgodnie z instrukcją dołączoną do urządzenia do inhalacji. Jeśli jest używany jako rozpuszczalnik postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu do inhalacji.

Skład

Chlorek sodu 0,99 g, woda oczyszczona q.s. 100 ml.

Przechowywanie

W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- W przypadku występowania u chorego ciężkich schorzeń oddechowych lub sercowo-naczyniowych należy skonsultować

stosowanie z lekarzem.

- Nie stosować preparatu w przypadku perforacji błony bębenkowej, przebytych operacji ucha lub przewlekłych schorzeń ucha.
- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu.

Dodatkowe informacje

- Nie stosować do iniekcji.
- Do użytku zewnętrznego.
- Nie połykać.
- Nie wstrzykiwać.

Środki ostrożności dotyczące wyrobu medycznego

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.