

Piascledine 100 mg + 200 mg, 30 kapsułek twardych



Cena: 75,95 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------|---------------------------|
| Dawka | 100 mg + 200 mg |
| Opakowanie | 30 kapsułek twardych |
| Postać | kapsułki twarde |
| Producent | LABORATOIRES EXPANSCIENCE |
| Rejestracja | Lek |
| Wiek | od 18 roku życia |

Opis produktu

Opis

Piascledine, lek którego substancjami czynnymi są niezmydlające się frakcje oleju awokado i oleju sojowego. Lek należy do grupy leków zwanych innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i przeciwreumatycznymi, określanymi także jako objawowe, powolnie działające leki w chorobie zwyrodnieniowej stawów.

Wskazania

Lek stosowany u dorosłych w łagodzeniu objawów choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych, takich jak ból i trudności w poruszaniu się.

Dawkowanie

- Dorośli, w tym pacjenci w podeszłym wieku: zalecana dawka to jedna kapsułka na dobę, przyjmowana podczas posiłku. Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. Nie należy jej rozgryzać ani żuć.
- Czas leczenia wynosi zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy.
- Działanie leku może wystąpić z opóźnieniem do kilku tygodni.
- Jeśli pacjent uważa, że poprawa nie następuje zbyt szybko, nie powinien przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Skład

Substancjami czynnymi leku są niezmydlające się frakcje oleju awokado i oleju sojowego. Każda kapsułka zawiera 100 mg oleju awokado frakcji niezmydlającej się i 200 mg oleju sojowego frakcji niezmydlającej się.

Pozostałe składniki to: butylohydroksytoluen, krzemu dwutlenek koloidalny, tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna, erytrozyna (E 127), żelaza tlenek żółty (E 172), żelatyna wołowa (Typu B), polisorbat 80.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na awokado i (lub) soję lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- Uczulenie na orzechy ziemne (np. orzeszki arachidowe, fistaszki).

Działania niepożądane

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi, jakie mogą wystąpić podczas leczenia lekiem Piascledine, są objawy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak biegunka, ból brzucha lub ból żołądka.

Podczas stosowania leku Piascledine mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

- Niezbyt często (rzadziej niż u 1 pacjenta na 100): biegunka, ból brzucha, ból lub pieczenie w żołądku (gastralgia), czerwona wysypka na skórze (wykwity skórne), ból głowy, nieprawidłowości dotyczące moczu (ciemny mocz).
- Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000): nudności, wymioty, zapalenie wątroby, żółtaczką lub zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi - szczególnie aminotransferaz lub gamma-glutamylotranspeptydazy (GGTP), swędzenie skóry, wysypka lub zaczerwienienie skóry, ból stawów, zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Lek przeznaczony wyłącznie dla dorosłych. Nie należy go stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.
- Inne leki i Piascledine: dotychczas nie stwierdzono oddziaływania (interakcji) między lekiem Piascledine a innymi lekami. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Należy zwłaszcza powiedzieć lekarzowi,

jeśli pacjent przyjmuje lek Piascledine jednocześnie z innymi lekami stosowanymi w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów.

- Lek ten z jedzeniem lub piciem: stosując ten lek, pacjent może jeść i pić jak zwykle.
- Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność: w ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować tego leku w okresie ciąży i karmienia piersią.
- Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.