

Pikopil 7,5 mg, 10 tabletek



Cena: 18,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	7,5 mg
Opakowanie	10 tabletek powlekanych
Postać	tabletki powlekane
Producent	VITAL PHARMA GMBH
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Sodium picosulfate
Wiek	od 10 roku życia

Opis produktu

Wskazania

Do krótkotrwałego łagodzenia dolegliwości związanych z przewlekłym lub nawracającym zaparciem u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 10 lat.

Działanie

Przeczyszczające. Lek działa poprzez stymulację ruchów jelita. Lek zwiększa także ilość wody znajdującej się w jelitach.

Dawkowanie

- Zaleca się, aby przyjmowanie leku rozpocząć od najmniejszej dawki. W celu uzyskania regularnych stolców dawkę można zwiększać do maksymalnej zalecanej dawki.
- Nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej dawki dobowej leku.
- Zalecana dawka początkowa wynosi zazwyczaj jedną tabletkę 5 mg na dobę (leczenie należy rozpocząć od podania podobnego leku o mniejszej mocy). Jeśli dawka 5 mg nie jest skuteczna, można ją zwiększyć do 7,5 mg na dobę (co odpowiada 1 tabletkę leku Pikopil o mocy 7,5 mg).
- Dzieci w wieku od 10 lat: zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi jedną tabletkę 5 mg na dobę (leczenie należy rozpocząć od podania podobnego leku o mniejszej mocy). Jeśli dawka 5 mg nie jest skuteczna, można ją zwiększyć do 7,5 mg na dobę (co odpowiada 1 tabletkę leku Pikopil o mocy 7,5 mg).
- Tabletkę należy przyjmować wieczorem, przed udaniem się na spoczynek, popijając ją wodą. Tabletkę można podzielić na równe dawki.
- Tak jak w przypadku innych leków nasilających ruchy jelit, nie należy przyjmować leku dłużej niż przez trzy kolejne dni. Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Skład

Substancją czynną leku jest sodu pikosiarczan.

- Każda tabletkę leku Pikopil o mocy 7,5 mg zawiera sodu pikosiarczan jednowodny, co odpowiada 7,5 mg sodu pikosiarczanu

bezwodnego.

- Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na sodu pikosiarczan, inne substancje należące do grupy pochodnych triarylometanu (np. bisakodyl) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- W przypadku ciężkiego odwodnienia (tj. utraty zbyt dużej ilości wody z ustroju);
- Jeśli jelito jest zablokowane (nieδροżność jelita);
- W przypadku poważnych zaburzeń brzusznych jak zapalenie wyrostka robaczkowego;
- Ostra choroba zapalna jelita;
- Silny ból w jamie brzusznej, który powoduje nudności lub wymioty;
- Jeśli tuż przed przyjęciem leku wystąpi nagły, ostry ból brzucha;
- W przypadku problemu zwanego nieδροżnością jelita, który występuje w przypadku zablokowania jelita cienkiego.

Działania niepożądane

- Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób): biegunka;
- Częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób): kurcze w jamie brzusznej; ból brzucha; przykre odczucie w górnej części brzucha;
- Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób): zawroty głowy*; zasłabnięcie*; wymioty; nudności; reakcje skórne.

*Zawroty głowy i zasłabnięcie mogą wystąpić zwłaszcza podczas oddawania stolca lub bólu brzucha spowodowanego zaparciem.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.