

Pikopil 7,5 mg, 30 tabletek



Cena: 35,16 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	30 szt
Dawka	7,5 mg
Opakowanie	30 tabletek
Postać	tabletki powlekane
Producent	FARMAK INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Natrii picosulfas

Opis produktu

Wskazania

Do krótkotrwałego łagodzenia dolegliwości związanych z przewlekłym lub nawracającym zaparciem u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 10 lat.

Działanie

Przeczyszczające. Lek działa poprzez stymulację ruchów jelita. Lek zwiększa także ilość wody znajdującej się w jelitach.

Dawkowanie

- Zaleca się, aby przyjmowanie leku rozpocząć od najmniejszej dawki. W celu uzyskania regularnych stolców dawkę można zwiększać do maksymalnej zalecanej dawki.
- Nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej dawki dobowej leku.
- Zalecana dawka początkowa wynosi zazwyczaj jedną tabletkę 5 mg na dobę (leczenie należy rozpocząć od podania podobnego leku o mniejszej mocy). Jeśli dawka 5 mg nie jest skuteczna, można ją zwiększyć do 7,5 mg na dobę (co odpowiada 1 tabletkę leku Pikopil o mocy 7,5 mg).
- Dzieci w wieku od 10 lat: zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi jedną tabletkę 5 mg na dobę (leczenie należy rozpocząć od podania podobnego leku o mniejszej mocy). Jeśli dawka 5 mg nie jest skuteczna, można ją zwiększyć do 7,5 mg na dobę (co odpowiada 1 tabletkę leku Pikopil o mocy 7,5 mg).
- Tabletkę należy przyjmować wieczorem, przed udaniem się na spoczynek, popijając ją wodą. Tabletkę można podzielić na równe dawki.
- Tak jak w przypadku innych leków nasilających ruchy jelit, nie należy przyjmować leku dłużej niż przez trzy kolejne dni. Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Skład

Substancją czynną leku jest sodu pikosiarczan.

- Każda tabletkę leku Pikopil o mocy 7,5 mg zawiera sodu pikosiarozan jednowodny, co odpowiada 7,5 mg sodu pikosiarozanu bezwodnego.
- Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na sodu pikosiarozan, inne substancje należące do grupy pochodnych triarylometanu (np. bisakodyl) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- W przypadku ciężkiego odwodnienia (tj. utraty zbyt dużej ilości wody z ustroju);
- Jeśli jelito jest zablokowane (nieδροżność jelita);
- W przypadku poważnych zaburzeń brzusznych jak zapalenie wyrostka robaczkowego;
- Ostra choroba zapalna jelita;
- Silny ból w jamie brzusznej, który powoduje nudności lub wymioty;
- Jeśli tuż przed przyjęciem leku wystąpi nagły, ostry ból brzucha;
- W przypadku problemu zwanego nieδροżnością jelita, który występuje w przypadku zablokowania jelita cienkiego.

Działania niepożądane

- Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób): biegunka;
- Częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób): kurcze w jamie brzusznej; ból brzucha; przykre odczucie w górnej części brzucha;
- Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób): zawroty głowy*; zasłabnięcie*; wymioty; nudności; reakcje skórne.

*Zawroty głowy i zasłabnięcie mogą wystąpić zwłaszcza podczas oddawania stolca lub bólu brzucha spowodowanego zaparciem.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.