

# Pikopil 7,5 mg/ ml, krople doustne, roztwór, 15 ml



Cena: 17,95 zł

## Opis słownikowy

Dawka	7,5 mg/ml
Opakowanie	15 ml
Postać	krople doustne, roztwór
Producent	VITAL PHARMA GMBH
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Sodium picosulfate
Wiek	od 4 roku życia

## Opis produktu

### Wskazania

Lek do krótkotrwałego łagodzenia dolegliwości związanych z przewlekłym lub nawracającym zaparciem.

### Działanie

Przeciszczające. Lek działa poprzez stymulację ruchów jelita. Lek zwiększa także ilość wody znajdującej się w jelitach.

### Dawkowanie

- Zaleca się, aby przyjmowanie leku rozpocząć od najmniejszej dawki. W celu uzyskania regularnych stolców, dawkę można zwiększać do maksymalnej zalecanej dawki. Nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej dawki dobowej leku.
- Dorośli: zalecana dawka wynosi od 8 do 12 kropli jednorazowo. Można przyjąć mniej lub więcej kropli leku, w celu ustalenia jaka jest optymalna dawka.
- Dzieci i młodzież: przed podaniem leku Pikopil dziecku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Lek ten jest mniej skuteczny u dzieci w wieku poniżej 4 lat.
- Dzieci w wieku powyżej 6 lat: od 8 do 12 kropli jednorazowo;
- Dzieci w wieku od 4 do 6 lat: 6 kropli jednorazowo.

### Sposób podawania:

- w celu podania roztworu doustnego należy odliczyć liczbę kropli na tyżkę;
- trzymając fiolkę w odwrotnej pozycji z kroplicznikiem ustawionym pionowo do dołu, należy delikatnie ścisnąć fiolkę;
- szybkość wycieku kropli nie przekracza 2 kropli na sekundę;
- jeśli kropla zawiera bańkę powietrza, nie należy jej liczyć i należy dodać kolejną kroplę.

Lek należy przyjmować wieczorem, przed udaniem się na spoczynek, popijając go płynem lub bez popijania. Działanie leku występuje zazwyczaj po około 6 do 12 godzinach, tak więc sen nie będzie przerwany.

Podczas przyjmowania tego leku należy pić w ciągu dnia dużo wody. Pozwoli to zapobiec odwodnieniu pacjenta.

Nie należy przyjmować tego leku dłużej niż przez 3 kolejne dni. Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

#### Skład

- Substancją czynną leku jest sodu pikosiarozan. 1 ml zawiera sodu pikosiarozan w ilości odpowiadającej 7,5 mg bezwodnego sodu pikosiarozanu (1 ml = 15 kropli).
- Pozostałe składniki to: sodu benzoesan, sorbitol, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, woda do wstrzykiwań.

#### Przeciwwskazania

- Uczulenie na sodu pikosiarozan, inne substancje należące do grupy pochodnych triarylometanu (np. bisakodyl) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- w przypadku ciężkiego odwodnienia (tj. utraty zbyt dużej ilości wody z ustroju);
- Jeśli jelito jest zablokowane (niezdolność jelita);
- Poważne zaburzenia brzuszne jak, zapalenie wyrostka robaczkowego;
- Ostra choroba zapalna jelita;
- Silny ból w jamie brzusznej, który powoduje nudności lub wymioty;
- Jeśli tuż przed przyjęciem leku wystąpi nagły, ostry ból brzucha;
- W przypadku problemu zwanego niezdolnością jelita, który występuje w przypadku zablokowania jelita cienkiego.

#### Działania niepożądane

Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie. Należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem lub wezwać pogotowie jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

- Reakcja alergiczna. Objawy mogą obejmować świąd, wysypkę, obrzęk warg, jamy ustnej, języka, gardła, trudności w oddychaniu.
- Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób): biegunka;
- Częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób): kurcze w jamie brzusznej; ból brzucha; przykre odczucie w górnej części brzucha;
- Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób): zawroty głowy\*; zasłabnięcie\*; wymioty; nudności; reakcje skórne.

\*Zawroty głowy i zasłabnięcie mogą wystąpić zwłaszcza podczas oddawania stolca lub bólu brzucha spowodowanego zaparciem.

#### Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

##### Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Jeśli pacjent przyjmuje ten lek przez długi czas lub w dużych dawkach, może to wpłynąć na ilość płynów i elektrolitów zawartych w jego ustroju. Może wystąpić zwłaszcza zmniejszenie stężenia potasu (hipokaliemia), zmniejszenie ilości wody (odwodnienie) lub biegunka. Podczas oddawania stolca lub z powodu bólu brzucha, wywołanego zaparciem, mogą wystąpić zawroty głowy lub zasłabnięcie. Tego leku nie należy przyjmować codziennie lub przez długi czas. Jeśli pacjent zauważy, że ma potrzebę przyjmowania tego leku codziennie lub jeśli objawy nie ustępują, lub często nawracają, należy skonsultować się z lekarzem w celu zdiagnozowania przyczyn zaparcia.

Jeśli po przyjęciu tego leku nie nasilają się ruchy jelita, należy przerwać stosowanie tego leku.

Jeśli powyższe sytuacje dotyczą pacjenta (lub jeśli pacjent nie jest pewien), przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

##### Dzieci i młodzież:

Przed podaniem tego leku dziecku należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą. Lek jest mniej skuteczny u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

##### Lek Pikopil a inne leki:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to także leków wydawanych bez recepty oraz leków pochodzenia roślinnego.

Należy tak postąpić, ponieważ ten lek może wpływać na działanie innych leków. Podobnie, inne leki mogą wpływać na działanie leku Pikopil.

Należy zwłaszcza powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

- leki wydawane na receptę, które mogą wpływać na ilość płynów w ustroju, jak: tabletki na odwodnienie (leki moczopędne) jak bendrofluazyd lub furosemid; leki steroidowe, jak prednizolon.
- niektóre leki stosowane w chorobach serca (jak digoksyna, digitoksyna). Zaburzenia równowagi płynowej oraz elektrolitowej w ustroju mogą powodować zwiększenie wrażliwości pacjenta na działanie tych leków.
- antybiotyki (stosowane do leczenia zakażeń). Jednoczesne stosowanie antybiotyków o szerokim zakresie działania może zmniejszać skuteczność tego leku.

#### Ciąża i karmienie piersią:

Nie należy stosować leku Pikopil podczas ciąży, chyba że lekarz zdecyduje, że jest on konieczny.

#### Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Mogą wystąpić zawroty głowy lub zasłabnięcie, zazwyczaj podczas oddawania stolca lub z powodu bólu brzucha związanego z zaparciem. Jeśli pacjent ma takie objawy, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

#### Lek Pikopil zawiera sorbitol:

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

#### **Dodatkowe informacje**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.