

PiniHelix syrop z wyciągiem z bluszczu, 120 ml



Cena: 15,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	101,9 mg/5ml
Opakowanie	120 ml
Postać	syrop
Producent	FARMINA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Hedera helix
Wiek	od 12 roku życia

Opis produktu

Opis

Syrop PiniHelix zawiera standaryzowany wyciąg z liści bluszczu oraz wyciągi z tymianku i lukrecji. Wyciągi roślinne ułatwiają odkaszczanie zalegającej wydzieliny przy kaszlu mokrym towarzyszącej przeziębieniu. Wyciągi z bluszczu, tymianku i lukrecji upłynniają zalegającą wydzielinę oskrzelową oraz łagodzą kaszel.

Wskazania

Produkt leczniczy roślinny tradycyjnie stosowany w przeziębieniach, przy towarzyszącym mokrym kaszlu.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 10 ml 3 razy dziennie. Nie należy stosować dłużej niż 7 dni.

Skład

100 g syropu zawiera:

- Płynny wyciąg z liści bluszczu (*Hederae helicis extractum fluidum*) 1,7g. Ekstrahent: alkohol 70%.
- Substancje pomocnicze: Suchy wyciąg z korzenia lukrecji (*Glycyrrhizae radix extra.sicc.*) 5,0 g, ekstrahent: woda do ekstrakcji, amonu wodorotlenek 10%.
- Płynny wyciąg z ziela tymianku (*Thymi extra. fl*) 4,0 g, ekstrahent: etanol 30% (v/v), woda amoniakalna, glicerol.
- Ziołomiód sosnowy, woda amoniakalna, sodu benzoesan, woda oczyszczona

Przeciwwskazania

- Nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, choroby wątroby i nerek, hipokaliemia.
- Nadwrażliwość na substancje czynne lub pomocnicze zawarte w preparacie.
- Uczulenie na miód lub produkty pszczele oraz na benzoesan sodu, rośliny z rodziny Araliowate (*Araliaceae*).

Działania niepożądane

Jak każdy lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.
Z częstotliwością poniżej 1/10 000: reakcje alergiczne (jak pokrzywka, wysypka skórna, duszność), objawy z przewodu pokarmowego (jak wymioty, nudności, biegunka). Bardzo rzadko (poniżej 1/10 000) przy dłuższym stosowaniu i jednoczesnym przekraczaniu zalecanych dawek mogą pojawić się objawy związane z przyjmowaniem kwasu glicyryzynowego: utrata potasu, zatrzymanie sodu i wody, bóle głowy, nadciśnienie tętnicze, obrzęki, osłabienie mięśni.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Należy zachować ostrożność u pacjentów z nieżytami żołądka oraz z wrzodami.
- Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.