

Pirolam, 10 mg/g, zawiesina na skórę, 20 g



Cena: 23,90 zł

Opis słownikowy

Dawka	10 mg/g
Opakowanie	20 g
Postać	zawiesina na skórę
Producent	MEDANA PHARMA SP. AKCYJNA
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Cyclopiroxum
Wiek	od 6 roku życia

Opis produktu

Opis

Pirolam, 10 mg/g, zawiesina na skórę, przeznaczona do stosowania miejscowego na skórę. Zawiera substancję czynną cyklopiroks z olaminą. Lek ten działa na występujące na skórze grzyby zwane dermatofitami, grzyby drożdżopodobne, pleśnie, mieszane zakażenia grzybicze. Ma on również działanie przeciwzapalne, co jest istotne szczególnie wtedy, gdy grzybicy towarzyszy stan zapalny. Do skóry lek przenika poprzez naskórek, mieszki włosowe i gruczoły łojowe.

Wskazania

Grzybica skóry gładkiej, grzybica skóry owłosionej, grzybica stóp, grzybica podudzi.

Działanie

Przeciwgrzybicze.

Dawkowanie

- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat:
- Lek stosuje się miejscowo na skórę, zwykle 2 razy na dobę na zmienioną chorobowo skórę, lekko wcierając lub pozostawiając do wyschnięcia.
- Leczenie należy prowadzić aż do ustąpienia objawów chorobowych.
- Optymalny czas leczenia wynosi 3 tygodnie.
- Aby zapobiec nawrotowi choroby zaleca się kontynuowanie leczenia przez okres 10 dni po ustąpieniu zmian chorobowych.
- Jeśli objawy nie ustąpią po 4 tygodniach leczenia, należy skontaktować się z lekarzem.
- Nie stosować opatrunków i plastrów.

Skład

- Substancją czynną leku jest cyklopiroks z olaminą.

Każdy gram zawiesiny na skórę zawiera 10 mg cyklopiroksu z olaminą.

- Pozostałe składniki to: glikol propylenowy, alkohol benzylowy, parafina ciekła, alkohol cetostearylowy, kwas mlekowy, makrogolu eter cetostearylowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na cyklopiroks z olaminą lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- Grzybicze zakażenie oka i okolic oczu,
- Niemowlęta i dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Działania niepożądane

- Często (występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów): obrzęk.
- Rzadko (występujące u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów): alergiczne kontaktowe zapalenie skóry.
- Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): pieczenie, podrażnienie skóry, rumień, świąd.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
- W oryginalnym opakowaniu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Jeśli wystąpi uczulenie, należy przerwać leczenie i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Przed rozpoczęciem stosowania leku Pirolam należy koniecznie zwrócić się do lekarza: jeśli pacjent ma cukrzycę, zaburzenia krążenia w dłoniach i stopach, zaburzenia odporności (np. zakażenia HIV, pacjenci po transplantacji, pacjenci leczeni jednocześnie kortykosteroidami, pacjenci z nawracającym lub długotrwałe utrzymującym się półpaścem lub opryszczką); jeśli pacjent ma choroby skóry, np. łuszczycę lub inne przewlekłe choroby skóry.
- Lek przeznaczony jest do stosowania wyłącznie na skórę.
- Swędzących, zakażonych miejsc nie należy drapać.
- Lek nie jest przeznaczony do leczenia grzybic pochwy.
- Należy chronić oczy przed kontaktem z lekiem.
- Unikać noszenia ubrań i obuwia nieprzepuszczającego wilgoci i ciepła.
- Po myciu i kąpeli miejsca chorobowo zmienione należy dokładnie osuszyć.
- Odzież stykającą się ze zmienioną chorobowo skórą, ręczniki i gąbki należy zmieniać codziennie i prać w temperaturze 90°C (zaleca się używanie ręczników jednorazowych).
- Nie używać mydeł o odczynie kwaśnym, gdyż sprzyja to rozmnażaniu niektórych grzybów.
- Brak danych na temat wzajemnego oddziaływania pomiędzy cyklopiroksiem z olaminą a innymi lekami.
- Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że lekarz zdecyduje, że jest to bezwzględnie konieczne.
- Lek może powodować miejscową reakcję skórą (np. kontaktowe zapalenie skóry).
- Lek zawiera 9 mg alkoholu benzylowego w każdym gramie zawiesiny. Alkohol benzylowy może powodować reakcje alergiczne lub łagodne miejscowe podrażnienie.
- Lek zawiera 50 mg glikolu propylenowego w każdym gramie zawiesiny.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.