

Pirolam, 10 mg/g, żel, 20 g

Cena: 23,95 zł



Opis słownikowy

Dawka	0,01 g/g
Opakowanie	20 g
Postać	żel
Producent	MEDANA PHARMA SP. AKCYJNA
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Ciclopiroxum
Wiek	od 6 roku życia

Opis produktu

Opis

Pirolam, 10 mg/g, żel przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. Zawiera substancję czynną cyklopiroks z olaminą. Lek ten działa na występujące na skórze grzyby zwane dermatofitami, grzyby drożdżopodobne, pleśnie, mieszane zakażenia grzybicze. Ma on również działanie przeciwzapalne, co jest istotne szczególnie wtedy, gdy grzybicy towarzyszy stan zapalny. Do skóry lek przenika poprzez naskórek, mieszki włosowe i gruczoły łojowe.

Wskazania

Grzybica skóry gładkiej, grzybica skóry owłosionej, grzybica stóp, grzybica podudzi.

Działanie

Przeciwgrzybicze.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat:

- Lek stosuje się miejscowo na skórę, zwykle 2 razy na dobę na zmienioną chorobowo skórę, lekko wcierając lub pozostawiając do wyschnięcia.
- Leczenie należy prowadzić aż do ustąpienia objawów chorobowych.
- Optymalny czas leczenia wynosi 3 tygodnie.
- Aby zapobiec nawrotowi choroby, zaleca się kontynuowanie leczenia przez okres 10 dni po ustąpieniu zmian chorobowych.
- Jeśli objawy nie ustąpią po 4 tygodniach leczenia, należy skontaktować się z lekarzem.
- Nie stosować opatrunków i plastrów.

Skład

Substancją czynną leku jest cyklopiroks z olaminą. Każdy gram żelu zawiera 10 mg cyklopiroksu z olaminą. Pozostałe składniki to: glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, etanol 96%, glicerol, karbomer, trolamina, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na cyklopiroks z olaminą lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- Grzybicze zakażenie oka i okolic oczu,
- Niemowlęta i dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Działania niepożądane

- Często (występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów): obrzęk.
- Rzadko (występujące u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów): alergiczne kontaktowe zapalenie skóry.
- Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): pieczenie, podrażnienie skóry, rumień, świąd.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Jeśli wystąpi uczulenie, należy przerwać leczenie i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Przed rozpoczęciem stosowania leku Pirolam należy koniecznie zwrócić się do lekarza: jeśli pacjent ma cukrzycę, zaburzenia krążenia w dłoniach i stopach, zaburzenia odporności (np. zakażenia HIV, pacjenci po transplantacji, pacjenci leczeni jednocześnie kortykosteroidami, pacjenci z nawracającym lub długotrwałe utrzymującym się półpaścem lub opryszczką); jeśli pacjent ma choroby skóry, np. łuszczycę lub inne przewlekłe choroby skóry.
- Lek przeznaczony jest do stosowania wyłącznie na skórę.
- Swędzących, zakażonych miejsc nie należy drapać.
- Należy chronić oczy przed kontaktem z lekiem.
- Unikać noszenia ubrań i obuwia nieprzepuszczającego wilgoci i ciepła.
- Po myciu i kąpeli miejsca chorobowo zmienione należy dokładnie osuszyć.
- Odzież stykającą się ze zmienioną chorobowo skórą, ręczniki i gąbki należy zmieniać codziennie i prać w temperaturze 90°C (zaleca się używanie ręczników jednorazowych).
- Nie używać mydeł o odczynie kwaśnym, gdyż sprzyja to rozmnażaniu niektórych grzybów.
- Brak danych na temat wzajemnego oddziaływania pomiędzy cyklopiroksiem z olaminą a innymi lekami.
- Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że lekarz zadecyduje, że jest to bezwzględnie konieczne.
- Lek zawiera etanol, parahydroksybenzoesan metylu (E218), parahydroksybenzoesan propylu (E216) oraz glikol propylenowy (E1520). Etanol: ten lek zawiera 160 mg alkoholu (etanolu) w każdym gramie żelu. Może powodować pieczenie uszkodzonej skóry. Parahydroksybenzoesan metylu i parahydrobenzoesan propylu: lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Glikol propylenowy: lek zawiera 110 mg glikolu propylenowego w każdym gramie żelu. Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.