

Pirolam Intima Vag 500 mg, 1 tabletko dopochwowa



Cena: 28,79 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,5 g
Opakowanie	1 tabletko dopochwowa
Postać	tabletko dopochwowa
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Clotrimazolum

Opis produktu

Wskazania

- Lek do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat.
- Lek stosuje się w leczeniu zakażeń pochwy i sromu (żeńskich zewnętrznych narządów płciowych) wywołanych przez mikroorganizmy, takie jak grzyby (zazwyczaj Candida), wrażliwe na klotrymazol.

Działanie

Przeciwgrzybicze, niszczy grzyby i hamuje ich wzrost. Lek jest skuteczny wobec drobnoustrojów takich jak: dermatofity, drożdżaki, pleśń.

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież od 16. roku życia: 1 tabletko dopochwowa, głęboko dopochwowo jak to możliwe, przed snem.
- Nie stosować podczas miesiączki.

Skład

- Substancja czynna: klotrymazol.
- Każda tabletko dopochwowa zawiera 500 mg klotrymazolu.
- Pozostałe substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, kwas adypinowy, sodu wodorowęglan, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan.

Przeciwwskazania

Uczulenie na klotrymazol lub którykolwiek składnik leku.

Przechowywanie

- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

- W oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.