

Plaster na odciski 400 mg/ g, plaster leczniczy, 4 sztuki



Cena: 5,95 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|------------------|
| Dawka | 400 mg/ g |
| Opakowanie | 4 sztuki |
| Postać | plaster |
| Producent | TOLEP SP. Z O.O. |
| Rejestracja | Lek |
| Substancja czynna | Acid.salicylic. |

Opis produktu

Wskazania

Usuwanie pojedynczych odcisków i modzeli.

Działanie

Kwas salicylowy stosowany miejscowo na zrogowaciały naskórek zmiękcza go i rozpułchnia, co ułatwia jego złuszczenie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwas salicylowy lub którykolwiek składnik leku (może wystąpić wysypka, podrażnienie skóry), niewydolność nerek i wątroby, zaburzenia krążenia, cukrzyca, jeśli modzel, odcisk lub skóra w otoczeniu odcisku jest uszkodzona, zmieniona zapalnie lub podrażniona, nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przechowywanie

W miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ciąża i okres karmienia piersią - stosowanie po konsultacji z lekarzem.

Należy przerwać leczenie i usunąć plaster na odciski, jeśli wystąpi stan zapalny skóry, podrażnienie lub uczulenie.

Plaster leczniczy należy nakładać wyłącznie na odcisk, nie należy stosować plastra na niezmienną zdrową skórę, ani na uszkodzoną skórę, gdyż kwas salicylowy wchłania się przez skórę i mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu salicylowego.

Lek może powodować wystąpienie podrażnienia skóry i wysypki.

Skład

Substancja czynna: kwas salicylowy.

1 g plastra leczniczego zawiera 400 mg kwasu salicylowego.

Inne składniki: lanolina, wosk pszczeli biały, żywica Staybelite Ester 10, warstwa nośna: folia PE 1000x0,120 mm, kółko z pianki PE.

Stosowanie

- Stosować miejscowo, najlepiej na noc, plaster nakładać wyłącznie na odcisk lub modzel.
- Przed użyciem plastra leczniczego należy namoczyć lub zwilżyć zrogowaciałą skórę, a następnie ją osuszyć.
- Zdjąć folię ochronną i przyłożyć plaster leczniczy w sposób, aby „kółko” przypadało dokładnie na odcisk. Następnie owinąć oba końce plastra leczniczego dookoła palca.
- Po 2 dniach należy zmienić plaster leczniczy, a po 4 dniach usunąć zmiękczone, zrogowaciały naskórek w ciepłej kąpieli solankowej lub mydlanej.
- W przypadkach uporczywych, terapię można powtarzać co 48 godzin.
- Nie stosować dłużej niż przez 14 dni.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.