

Plaster na odciski 400 mg Tolep, 6 sztuk



Cena: 6,50 zł

Opis słownikowy

Dawka	400 mg
Opakowanie	6 sztuk
Postać	plastry leczniczy
Producent	TOLEP SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Acidum salicylicum

Opis produktu

Wskazania

Usuwanie pojedynczych odcisków lub modzeli.

Działanie

kwas salicylowy, który wykazuje działanie keratolityczne, zmięczające i rozpuszczające zrogowaciały naskórek. Kwas salicylowy ułatwia złuszczenie naskórka.

Dawkowanie

- Lek do stosowania miejscowego.
- Plaster stosować wyłącznie na modzel lub odcisk.
- Przed użyciem plastra zwilżyć lub namoczyć zrogowaciałą skórę i osuszyć.
- Zdjąć folię ochronną i przyłożyć plaster leczniczy aby „kółko” przypadało dokładnie na odcisk. Owinąć oba końce plastra leczniczego dookoła palca.
- Po 2 dniach zmienić plaster, a po 4 dniach usunąć zmięczony, zrogowaciały naskórek w ciepłej kąpieli mydlanej lub solankowej.

Skład

Substancją czynną jest: kwas salicylowy (Acidum salicylicum).

1 g plastra leczniczego zawiera 400 mg kwasu salicylowego.

Substancje pomocnicze: lanolina, wosk pszczeli biały, żywica Staybelite Ester 10; warstwa nośna: folia PE 1000x0,120 mm, kółko z pianki PE.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną – kwas salicylowy, lub którąkolwiek substancję pomocniczą (może wystąpić wysypka, podrażnienie skóry, uczulenie, kontaktowe zapalenie skóry),
- Jeśli modzel, odcisk lub skóra w otoczeniu odciska jest uszkodzona, zraniona, zmieniona lub zapalnie podrażniona.

- Cukrzyca, zaburzenia krążenia, niewydolność wątroby i nerek.

Przechowywanie

W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.