

# Polfungicid (50 mg + 10 mg)/ ml, płyn, 10 ml



Cena: 51,90 zł

## Opis słownikowy

Dawka	(50 mg + 10 mg)/ ml
Opakowanie	10 ml
Postać	płyn do stosowania na skórę
Producent	ICN POLFA RZESZÓW S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Chlormidazoli hydrochloridum, Acidum salicylicum

## Opis produktu

### Wskazania

W leczeniu grzybiczych i bakteryjnych zakażeń paznokci i skóry – grzybic międzypalcowych, a szczególnie przypaznokciowych.

### Działanie

Przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne.

### Dawkowanie

Zazwyczaj stosowana dawka leku: 2 lub 3 razy na dobę pędzlować roztworem zmienioną chorobowo okolice.

### Skład

Substancjami czynnymi leku są chlormidazolu chlorowodorek i kwas salicylowy.

Inne składniki leku to: alkohol izopropylowy, disodu edetynian, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

### Przeciwwskazania

Uczulenie (nadwrażliwość) na chlormidazolu chlorowodorek, kwas salicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

### Działania niepożądane

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: miejscowe objawy podrażnienia skóry - zaczerwienienie, pieczenie lub swędzenie skóry (częstość nie znana - nie może być określona na podstawie dostępnych danych); w razie ich wystąpienia należy przerwać stosowanie leku.

### Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25°C.
- W oryginalnym opakowaniu.
- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Jeśli wystąpi zaczerwienienie, pieczenie lub świąd skóry na którą podano lek, należy przerwać jego stosowanie i zgłosić się do lekarza.
- Unikać kontaktu leku z oczami oraz błonami śluzowymi. Gdy dojdzie do kontaktu leku z okiem lub błoną śluzową, należy je przepłukać dużą ilością wody i zgłosić się do lekarza.
- Lek zawiera glikol propylenowy i może powodować podrażnienie skóry.
- Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Kwas salicylowy (jeden ze składników leku) może zmieniać przepuszczalność skóry dla innych stosowanych jednocześnie substancji, dlatego należy unikać podawania innych leków, kosmetyków itp. na leczonej skórze.
- Lek stosuje się na skórę - można stosować niezależnie od posiłków.
- Ciąża i karmienie piersią: przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
- Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

**Dodatkowe informacje**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.