

PreOp, preparat odżywczy o smaku cytrynowym, 4 butelki x 200 ml



Cena: 35,86 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	4 szt. po 200 ml
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	

Opis produktu

Opis

Preparat odżywczy PreOp o dużej zawartości węglowodanów, sodu i potasu dla pacjentów przed i po planowanej operacji chirurgicznej. Ważnym atutem produktu jest to, że nie zawiera białka i białka mleka krowiego dlatego bardzo często jest polecany przez lekarzy dla pacjentów dializowanych.

- Zawiera węglowodany i elektrolity.
- Zawiera substancje słodzące: acesulfam K i sól sodowa sacharyny.
- Bezreszkowy.
- Produkt bezglutenowy.
- Niska osmolarność.
- Płyn o smaku cytrynowym.
- Nie zawiera białka.
- Nie zawiera białka mleka krowiego.

Zastosowanie

Preparat odżywczy PreOp jest zalecany zarówno w ramach przygotowania pacjentów do planowanych zabiegów chirurgicznych jak i po zabiegach. Odpowiednia ilość węglowodanów zawarta w preparacie PreOp pozwala na ograniczenie sytuacji głodzenia przed operacją oraz zmniejszenie pooperacyjnej insulinooporności.

Zalecane spożycie

Produkt gotowy do spożycia, przeznaczony do picia. Najlepiej podawać schłodzony. Przed wypiciem należy wstrząsnąć buteleczką.

Dawka początkowa: 4 x 200 ml wieczorem przed operacją

Dawka końcowa: 2 x 200 ml dwie godziny przed znieczuleniem

Skład

Wartości odżywcze	Jednostka	Zawartość w 100 ml
Energia	J/kcal	215/50
Tłuszcz	g	0
W tym kwasy nasycone	g	0
Węglowodany 100% energii	g	12,6
w tym cukry	g	2,1
Laktoza	g	<0,006
Błonnik	g	0
Białko	g	0
Sól	g	0,13
Składniki mineralne i pierwiastki śladowe		
Sód	mg	50
Potas	mg	122
Chlorki	mg	6
Wapń	mg	6
Fosfor	mg	1
Magnez	mg	1
Inne		
H ₂ O	ml	92
Osmolarność	mOsmol/l	240
Procent (%) energii z:		
tłuszczów	%	0
węglowodanów	%	100
błonnika	%	0
białka	%	0

Składniki: woda, maltodekstryna, fruktoza, cytrynian potasu, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, substancje słodzące (acesulfam K, sól sodowa sacharyny).

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Po pierwszym otwarciu opakowania produkt przechowywać w lodówce, w zamkniętej butelce, nie dłużej niż 24 godziny.

Przeciwwskazania

Stosować pod nadzorem lekarza. Nie stosować w przypadku nagłych operacji oraz u pacjentów z opóźnionym opróżnianiem żołądka. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Produkt nieodpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia. Stosować ostrożnie u dzieci oraz u pacjentów z cukrzycą. Nie stosować u niemowląt.

