

Procto-Glyvenol, 400 mg + 40 mg, 10 czopków doodbytniczych

Cena: 35,99 zł



Opis słownikowy

Dawka	400 mg + 40 mg
Opakowanie	10 czopków doodbytniczych
Postać	czopki doodbytnicze
Producent	RECORDATI IRELAND LTD
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Tribenosidum, Lidocaini hydrochloridum

Opis produktu

Opis

Procto-Glyvenol to lek w postaci czopków doodbytniczych na hemoroidy. Lek w postaci czopków działa miejscowo, praktycznie nie wywiera działania ogólnoustrojowego.

Wskazania

Do miejscowego leczenia zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów.

Działanie

- Tribenozyd działa przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, przeciwbólowo, przeciwświądowo, a także przeciwdziała uszkodzeniom śródbłonna naczyniowego.
- Lidokaina jest substancją miejscowo znieczulającą i łagodzi dolegliwości spowodowane hemoroidami tj. świąd, pieczenie i ból.

Dawkowanie

- Podanie doodbytnicze.
- Zalecana dawka: 1 czopek rano oraz 1 czopek wieczorem – aż do ustąpienia ostrych objawów. Następnie dawkę można zmniejszyć, stosując 1 czopek raz na dobę.
- Należy stosować do ustąpienia objawów. Jeśli po upływie 7 dni stosowania nie nastąpiła poprawa lub pojawiły się inne, nieobserwowane wcześniej objawy, należy zwrócić się do lekarza, aby wykluczyć inne potencjalne przyczyny tych dolegliwości.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są tribenozyd i lidokaina. Jeden czopek zawiera 400 mg tribenozydu i 40 mg lidokainy.
- Pozostałe składniki to: tłuszcz (Witepsol E85) i tłuszcz (Witepsol W35).

Przeciwwskazania

Uczulenie na tribenozyd, lidokainę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, lub na inne leki znieczulenia miejscowego o budowie amidowej.

Działania niepożądane

- Rzadko występujące działania niepożądane (więcej niż 1 osoba na każde 10 000 leczonych, mniej niż 1 osoba na każde 1000 leczonych): pokrzywka, świąd w miejscu podania, wysypka w miejscu podania, ból w miejscu podania.
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 10 000): reakcja anafilaktyczna, zaburzenia sercowo-naczyniowe, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 30°C.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Przed rozpoczęciem stosowania tego leku w postaci czopków u osób z zaburzeniami czynności wątroby należy omówić to z lekarzem.
- Lek należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z ciężkim uszkodzeniem wątroby.
- W uzupełnieniu leczenia hemoroidów tym lekiem, zaleca się utrzymywanie należytej higieny okolicy odbytu, stosowanie odpowiednich ćwiczeń fizycznych oraz stosowanie odpowiedniej diety w celu utrzymania odpowiednio miękkiej konsystencji stolca.
- Nie wolno stosować leku doustnie.
- Należy unikać kontaktu z oczami.
- Nie należy stosować tego leku u dzieci, ponieważ nie są dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania w tej grupie wiekowej.
- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane są bez recepty.
- Leku w postaci czopków nie należy stosować podczas pierwszych 3 miesięcy ciąży. Lek może być stosowany od 4 miesiąca ciąży oraz w okresie karmienia piersią, pod warunkiem nieprzekraczania zalecanych dawek.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.