

Procto-Glyvenol, krem doodbytniczy, 30g

Cena: 35,99 zł



Opis słownikowy

Cena jednostkowa	30 g
Dawka	(0,05g+0,02g)/g
Opakowanie	30 g
Postać	krem doodbytniczy
Producent	RECORDATI IRELAND LTD
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Tribenosidum, Lidocaini hydrochloridum

Opis produktu

Opis

Procto-Glyvenol, lek w postaci kremu doodbytniczego na hemoroidy. Przeznaczony jest do miejscowego leczenia wewnętrznych i zewnętrznych hemoroidów. Zawarty tribenozyd działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo i przeciwświądowo. Zapobiega również uszkodzeniu śródbłonna naczyń krwionośnych. Lidokaina jest substancją miejscowo znieczulającą. Łagodzi przykre dolegliwości związane z hemoroidami, takie jak ból, świąd i pieczenie.

Wskazania

Lek do miejscowego leczenia hemoroidów wewnętrznych i zewnętrznych.

Działanie

Stosowany doodbytniczo ma działanie łagodzące stan zapalny i obrzęk. Działa także znieczulająco. Ułatwia wypróżnianie się oraz wykonywanie codziennych czynności.

Dawkowanie

- Doodbytniczo.
- Należy dokładnie umyć ręce po każdym zastosowaniu leku.
- Stosować rano i wieczorem, aż do ustąpienia ostrych objawów. Następnie dawkę można zmniejszyć stosując krem raz na dobę.
- W przypadku leczenia wewnętrznych hemoroidów, krem należy nakładać za pomocą załączonego aplikatora, który należy nakręcić na gwint tuby. Aplikator zaopatrzony jest w kapturek ochronny. Należy go zdjąć przed użyciem kremu, a po aplikacji umieścić na swoim miejscu.
- Nie należy przekraczać zalecanych dawek leku.
- Jeśli po upływie 7 dni stosowania nie nastąpiła poprawa lub pojawiły się inne, nieobserwowane wcześniej objawy, należy skonsultować się z lekarzem, aby wykluczyć inne potencjalne przyczyny tych dolegliwości.

Skład

Substancje czynne: tribenozyd (Tribenosidum) i lidokainy chlorowodorek (Lidocainihydrochloridum).
1 g kremu zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg lidokainy chlorowodoru. Substancjami pomocniczymi są: sorbitanu stearynian (Arlacel 60), makrogolu eter cetostearylowy (Cetomakrogol 1000), alkohol cetylowy, izopropylu palmitynian, parafina ciekła, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, sorbitol ciekły, niekrystalizujący, woda oczyszczona, kwas stearynowy.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na tribenozyd, lidokainy chlorowodorek lub którąkolwiek substancję pomocniczą, lub na inne leki znieczulenia miejscowego o budowie amidowej.
- Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 30°C.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.