

Procto-Hemolan, krem doodbytniczy, 20 g

Cena: 26,95 zł



Opis słownikowy

Dawka	(50 mg+20 mg)/g
Opakowanie	20 g
Postać	krem doodbytniczy
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Tribenosidum, Lidocaini hydrochloridum

Opis produktu

Wskazania

Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu.

Działanie

Leczniczo i łagodząco na objawy spowodowane żylakami odbytu (ból, pieczenie, swędzenie, napięcie skóry). Produkt zmniejsza przepuszczalność naczyń krwionośnych i poprawia napięcie ściany naczyniowej, zmniejsza też stan zapalny towarzyszący hemoroidom. Obecny w produkcie chlorowoderek lidokainy działa znieczulająco dzięki czemu łagodzi najbardziej dokuczliwe objawy. Substancje czynne zawarte w leku działają miejscowo i nie wywierają działania ogólnego.

Dawkowanie

- Lek należy stosować doodbytniczo.
- Za pomocą dołączonego aplikatora nakładać lek (pasma długości około 1 cm) na miejsce zmienione chorobowo dwa razy na dobę rano i wieczorem.
- Po ustąpieniu ostrych objawów lek można stosować jeden raz na dobę.
- Przed zastosowaniem leku należy starannie umyć okolicę odbytu.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są: tribenozyd i chlorowoderek lidokainy.
- 1 g kremu zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg chlorowodoru lidokainy.
- Pozostałe składniki to: alkohol cetylowy, kwas stearynowy, parafina ciekła, izopropylu palmitynian, makroglu eter cetostearylowy, sorbitanu stearynian, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, sorbitol, ciekły niekryształizujący, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, a w szczególności przy stwierdzonej

nadwrażliwości na środki miejscowo znieczulające (stosowane np. do znieczuleń w stomatologii).

Działania niepożądane

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000): uczucie lekkiego pieczenia; ból; nasiloną perystaltyka jelit.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.