

Procto-Zac, żel proktologiczny, 30 ml



Cena: 31,99 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	30 ml
Opakowanie	30 ml
Postać	żel
Producent	HEXANOVA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Opis

Procto-zac to lekki żel stworzony, aby szybko przynosić ulgę i przywracać uczucie komfortu oraz świeżości przy dolegliwościach odbytu i odbytnicy. Opatentowana formuła kwasu hialuronowego z technologią Tri-SolveP® zawarta w żelu ma działanie łagodzące i ochronne na śluzówkę odbytu. Zmniejsza uczucie pieczenia oraz ból, działa antybakteryjnie na okolice odbytu. Sprzyja regeneracji błony śluzowej po zabiegach chirurgicznych. Przywraca i utrzymuje fizjologiczne napięcie i elastyczność śluzówki odbytu chroniąc ją przed czynnikami drażniącymi. Zmniejsza uczucie tarcia przy wypróżnianiu, chroni przed podrażnieniami i przekrwieniem w okolicach odbytu, zapewniając natychmiastową ulgę. Nie zawiera kortyzonu ani innych hormonów.

Zastosowanie

- Efektywne leczenie w dolegliwościach odbytu i odbytnicy, wewnętrznych i zewnętrznych hemoroidach, szczelinach odbytu, zapaleniu odbytnicy i świądzie odbytu.
- Wspomagająco przy problemach z wypróżnianiem (zatwardzenia) oraz w przypadku skłonności do nawrotów hemoroidów. Zmniejszenie i łagodzenie bólu oraz uczucia swędzenia i pieczenia.

Sposób użycia

- Stosować w okolicach odbytu i odbytnicy oraz doodbytniczo.
- Aplikować 2-3 razy dziennie po każdym wypróżnieniu.
- Leczenie kontynuować przez 1-2 tygodnie, do czasu ustąpienia objawów.

Skład

Kwas hialuronowy, Trisolve P® (trehaloza, ceramid NS, uwodorniona lecytyna), olejek Melaleuca alternifolia, metylosulfonylometan, gliceryna, hydroksyetyloceluloza, bisabolol, woda, sorbitol, glikol pentylenowy, glikol propylenowy, wersenian sodu, sól wapniowo-sodowa kopolimeru PVM/MA, triklosan, symdiol (1,2-heksanediol, tropolon, glikol kaprylowy), wodorotlenek sodu.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- W trakcie ciąży lub karmienia piersią, należy skonsultować z lekarzem.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik.
- Nie stosować produktu dłużej niż przez 30 dni. Nie przekraczać zalecanego dawkowania.

Dodatkowe informacje

Produkt został przetestowany dermatologicznie. Brak danych dotyczących interakcji z lekami zwyczajowo stosowanymi w leczeniu hemoroidów i szczelin odbytu.