

# Proktosedon 5 mg + 5 mg + 10 mg + 10 mg/ g, maść doodbytnicza, 15 g



Cena: 29,69 zł

## Opis słownikowy

Dawka	5 mg + 5 mg + 10 mg + 10 mg/ g
Opakowanie	15 g
Postać	maść doodbytnicza
Producent	POLMEX SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Cinchocaini hydrochloridum, Esculinum, Hydrocortisonum, Neomycinum

## Opis produktu

### Opis

Proktosedon, lek o skojarzonym działaniu składników. Maść Proktosedon jest wskazana w leczeniu hemoroidów zewnętrznych i wewnętrznych, w przewlekłych i ostrych stanach zapalnych odbytu, szczeliny odbytu i świądu odbytu. Może być stosowana w okresie przed- i pooperacyjnym.

### Wskazania

W leczeniu hemoroidów zewnętrznych i wewnętrznych, w przewlekłych i ostrych stanach zapalnych odbytu, szczeliny odbytu i świądu odbytu. Może być stosowana w okresie przed- i pooperacyjnym.

### Działanie

- Hydrokortyzon działa przeciwzapalnie, cynchokaina miejscowo znieczulająco.
- Neomycyna - antybiotyk o szerokim zakresie działania, zapobiega wtórnym zakażeniom i leczy miejscowe zakażenia wywołane przez gronkowce i wrażliwe

bakterie Gram-ujemne.

- Eskulina hamuje krwawienia z naczyń i zmniejsza obrzęki.
- Lek zmniejsza objawy występujące w żylakach odbytu, tj. stan zapalny, ból, świąd, obrzęk i krwawienie.

### Dawkowanie

- U dorosłych zwykle stosuje się maść przez trzy do sześciu dni, do ustąpienia stanu zapalnego. Jeśli po upływie tego czasu nie nastąpi poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.
- Za pomocą aplikatora nakładać niewielką ilość maści do odbytu i na zewnątrz, rano i wieczorem oraz po każdym wypróżnieniu.

### Skład

Substancjami czynnymi leku są: octan hydrokortyzonu, chlorowodorek cynchokainy, eskulina i siarczan neomycyny.

1 g maści zawiera:

- substancje czynne: 5 mg hydrokortyzonu w postaci octanu (Hydrocortisonum), 5 mg chlorowodoru cynchokainy (Cinchocaini hydrochloridum), 10 mg siarczanu neomycyny (Neomycini sulfas), 10 mg eskuliny w postaci półtorawodzianu (Esculinum)
- substancje pomocnicze: parafina ciekła, wazelina biała, lanolina bezwodna.

### Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- Jeśli u pacjenta stwierdzono cukrzycę, gruźlicę, jaskrę, osteoporozę, ostrą psychozę, zakażenie grzybicze lub wirusowe lub w zakrzepicę żylną.
- Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

### Działania niepożądane

- Sporadycznie może pojawić się pieczenie odbytu, zwłaszcza jeśli naskórek jest znacznie uszkodzony.
- Podczas długotrwałego stosowania mogą wystąpić objawy niepożądane spowodowane ogólnoustrojowym działaniem hydrokortyzonu.

### Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 30°C.

### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.