

Pudroderm (9,8 mg + 9,8 mg + 245 mg)/ g, 140 g



Cena: 16,19 zł

Opis słownikowy

Dawka	(9,8 mg + 9,8 mg + 245 mg)/ g
Opakowanie	140 g
Postać	zawiesina na skórę
Producent	MARIA LISOWSKA LABORATORIUM FARMACEUTYCZNO-KOSMETYCZNE PAMPA
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Zinci oxydum, Benzocainum, Mentholum czynna

Opis produktu

Opis

Pudroderm, lek w postaci zawiesiny przeznaczonej do stosowania na skórę. Substancjami czynnymi leku są benzokaina, mentol i tlenek cynku.

Wskazania

Pomocniczo w ospie wietrznej, półpaścu, w stanach zapalenia skóry przebiegających z wysypką, świądem, obrzękiem, w świądzie neurogennym; po ukąszeniach owadów (np. przez komary, osy, meszki); pod kontrolą lekarza po naświetlaniach radiologicznych.

Działanie

Miejscowo znieczulające, przeciwświądowe, osłaniające i ściągające.

Dawkowanie

- Lek stosować na skórę. Przed zastosowaniem zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać przez energiczne wstrząśnięcie. Wstrząsnąć przed każdym

użyciem.

- Zwykle na zmienione chorobowo miejsca na skórze nakłada się niezbyt cienką warstwę zawiesiny 2 do 3 razy na dobę lub w razie potrzeby częściej. Leku nie należy wcierać w skórę ani przykrywać opatrunkiem.
- Lek zmywa się łatwo bieżącą, ciepłą wodą.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: benzokaina, mentol i cynku tlenek.

Pozostałe składniki to: talk, glicerol 99,5%, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Nie stosować leku: na rany; na duże powierzchnie skóry; na skórę uszkodzoną, np. pozbawioną naskórka; długotrwale; pod opatrunki okluzyjne.

Działania niepożądane

Po zastosowaniu leku mogą wystąpić objawy miejscowego podrażnienia skóry. Jeżeli objawy podrażnienia nasilią się lub nie ustąpią po kilku dniach, należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci. Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku do 2 lat, gdyż miejscowe stosowanie benzokainy może prowadzić do methemoglobinemii i wystąpienia reakcji nadwrażliwości. Należy zachować ostrożność stosując lek u starszych dzieci.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku do 2 lat.
- Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem.
- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Benzokaina zaburza działanie sulfonamidów. Miejscowo znieczulające działanie benzokainy ulega osłabieniu w obecności nadtlenku benzoilu, który często jest składnikiem stosowanych miejscowo leków przeciwtwardzikowych. Z tego powodu przed nałożeniem tego leku, u pacjentów stosujących produkty zawierające nadtlenek benzoilu należy dokładnie oczyścić skórę z ich pozostałości.
- W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
- Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.