

Pulmopect 30 mg/5ml, syrop, 200 ml



Cena: 26,90 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	200 ml
Dawka	30 mg/5ml
Opakowanie	200 ml
Postać	syrop
Producent	ADAMED PHARMA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Levodropropizynum

Opis produktu

Opis

Pulmopect jest lekiem zawierającym substancję czynną lewodropropizynę, należącą do grupy leków o działaniu przeciwkaszlowym. Stosowany jest w objawowym leczeniu suchego kaszlu.

Wskazania

Pulmopect wskazany jest do leczenia objawów suchego, nieproduktywnego kaszlu.

Dawkowanie

Zalecane jest stosowanie produktu leczniczego pomiędzy posiłkami.

U dorosłych: zalecana dawka leku to 10 ml trzy razy na dobę, w odstępach nie mniejszych niż 6 godzin pomiędzy dawkami.

U dzieci w wieku powyżej 2 lat:

- 10-20 kg: zalecana dawka to 3 ml syropu trzy razy na dobę.
- 20-30 kg: zalecana dawka to 5 ml syropu trzy razy na dobę.

Skład

Substancją czynną leku jest lewodropropizyna. 5 ml syropu zawiera 30 mg lewodropropizyny.

Pozostałe składniki: kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, sacharoza, aromat malinowy A (substancje i preparaty aromatyzujące, naturalne substancje aromatyzujące, glikol propylenowy (E1520), alkohol etylowy), woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- śluzotok oskrzelowy (nadmierna wydzielina z oskrzeli), stan charakteryzujący się wytwarzaniem dużej ilości śluzu (flegmy).
- Jeśli u pacjenta występują zaburzenia oddechowe charakteryzujące się zmniejszeniem zdolności do wydalania śluzu (zespół Kartagenera, dyskineza rzęsek).

- Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.
- Nie należy stosować tego produktu u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek z niżej wymienionych objawów:

- ciężkie przypadki reakcji skórnych (pokrzywka, świąd) lub chorób skóry, np. przebiegających z tworzeniem się pęcherzy (epidermoliza);
- nierówna praca serca (ryzyko arytmii serca);
- reakcja alergiczna/anafilaktyczna, w postaci obrzęku, duszności, wymiotów i biegunki;
- niebezpiecznie małe stężenie cukru we krwi, który może doprowadzić do utraty przytomności (śpiączka hipoglikemiczna).

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci

- senność, zmniejszenie napięcia mięśniowego i wymioty u noworodka, karmionego piersią przez matkę, która przyjmowała lewodropropizynę. Objawy te pojawiły się po karmieniu piersią i ustępowały samoistnie po omięciu kilku karmień (piersią).

Przechowywanie

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować po upływie 6 miesięcy od daty pierwszego otwarcia butelki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy stosować leku Pulmopect dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.