

Puwer Biflorin Elektrolity, 10 saszetek



Cena: 11,43 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------|-------------------------|
| Opakowanie | 10 saszetek |
| Postać | proszek |
| Producent | PUWER POLSKA SP. Z O.O. |
| Rejestracja | |

Opis produktu

Opis

Biflorin Elektrolity to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczona do uzupełnienia niezbędnych elektrolitów w przypadku odwodnienia. Jest to odpowiednio dobrany skład elektrolitów i glukozy o obniżonej osmolarności 245 mOsm/l, zgodnymi z zaleceniami ESPGHA (Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci). Elektrolity Biflorin zawierają naturalny aromat truskawkowy, co ułatwia podanie produktu dziecku.

Zastosowanie

Uzupełnienie utraconych elektrolitów, nawodnienie organizmu, szczególnie polecane w przypadku biegunki i wymiotów.

Zalecane spożycie

- 1 saszetki rozpuścić w ok.170 ml chłodnej wody (3 saszetki w 500ml wody).
- Nie dosładzać roztworu.
- Pić małymi porcjami co 5 minut.
- Dzieciom płyn można podawać z butelki.
- Zaleca się podawać do 6 saszetek (1000 ml) w ciągu pierwszych 4 godzin.
- Na dalszym etapie nawadniania lub podczas postępowania profilaktycznego, tzn. za nim dojdzie do odwodnienia, podawać porcjami po 100 ml po każdym biegunkowym stolcu lub po wymiotach.

| Skład | Składnik | mmol/litr | W 100g (mg) |
|-------|-----------|-----------|-------------|
| | Glukoza | 90 | 67 500 |
| | Sód | 65 | 6 150 |
| | Potas | 25 | 3 950 |
| | Chlorki | 53 | 7 775 |
| | Cytrynian | 12 | 9 450 |

Skład: glukoza, cytrynian sodu, chlorek potasu, naturalny aromat truskawkowy zagęszczony sok proszek, substancja słodząca: sacharyny.

Przechowywanie

Preparat należy przechowywać w temperaturze do 25°C w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
- Nie stosować w przypadku niedrożności jelit, wystąpienia krwi w stolcu lub wstrząsu hemodynamicznego.
- Produkt zawiera glukozę- chorzy na cukrzycę powinni zachować ostrożność.
- Produkt zawiera sód i potas- osoby leczone z powodu nadciśnienia powinny zachować ostrożność.
- Produkt musi być stosowany pod nadzorem lekarza, nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia, nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.