

# Pyrantelum Medana, zawiesina doustna 0,25 g/ 5ml, od 2 roku życia, 15 ml



Cena: 21,90 zł

## Opis słownikowy

Cena jednostkowa	15 ml
Dawka	0,25 g/5ml
Opakowanie	15 ml
Postać	zawiesina doustna
Producent	MEDANA PHARMA SP. AKCYJNA
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Pyrantelum
Wiek	od 2 roku życia

## Opis produktu

### Opis

Pyrantelum, lek stosowany w leczeniu owsicy. Substancją czynną leku jest pyrantel. Lek ten jest lekiem przeciwpasożytniczym, przeznaczonym dla dzieci w wieku od 2 lat i dorosłych w leczeniu zakażenia jelitowego owsikami - robakami obłymi typu nicieni barwy białej. Warunkiem zastosowania leku jest stwierdzenie występowania owsików w kale i (lub) okolicy odbytu.

### Wskazania

Owsica.

### Działanie

Lek przeciwpasożytniczy, działa na mięśnie pasożytów jelitowych. Unieruchomione pasożyty zostają usunięte z jelita wskutek ruchów perystaltycznych jelit. Pyrantel nie podrażnia jelit ani nie wywołuje przemieszczania się robaków. Działa na formy dojrzałe i pasożyty we wczesnym stadium rozwoju, natomiast nie działa na larwy w trakcie ich migracji w tkankach.

### Dawkowanie

- Dorośli i dzieci: zalecana dawka u dorosłych i dzieci od 2 lat o masie ciała od 11 kg: 11 mg/kg mc. jednorazowo. Dawkę tę należy powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach od przyjęcia pierwszej dawki. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Jeśli objawy utrzymują się po podaniu drugiej dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.
- Do opakowania dołączona jest miarka z podziałką, ułatwiająca dawkowanie.
- Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby powinni przed przyjęciem leku skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić mniejszą dawkę, gdyż lek może niekorzystnie wpływać na wątrobę.
- Lek przyjmuje się doustnie, w trakcie lub niezależnie od posiłku. Przed użyciem wstrząsnąć do uzyskania jednorodnej zawiesiny.

Nie ma konieczności stosowania środków przeczyszczających przed podaniem tego leku.

Dawkowanie zawiesiny doustnej Pyrantelum Owix w zależności od masy ciała:

- masa ciała: Dzieci o mc. <11 kg lub w wieku poniżej 2 lat: lek należy stosować jedynie pod nadzorem lekarza,
- masa ciała: 11-16 kg: dawka jednorazowa (ml): 2,5 ml, dawka jednorazowa (mg): 125 mg,
- masa ciała: 17-28 kg: dawka jednorazowa (ml): 5,0 ml, dawka jednorazowa (mg): 250 mg,
- masa ciała: 29-39 kg: dawka jednorazowa (ml): 7,5 ml, dawka jednorazowa (mg): 375 mg,
- masa ciała: 40-50 kg: dawka jednorazowa (ml): 10,0 ml, dawka jednorazowa (mg): 500 mg,
- masa ciała: 51-62 kg: dawka jednorazowa (ml): 12,5 ml, dawka jednorazowa (mg): 625 mg,
- masa ciała: 63-75 kg: dawka jednorazowa (ml): 15,0 ml, dawka jednorazowa (mg): 750 mg,
- Dorośli o mc. >75 kg: dawka jednorazowa (ml): 20,0 ml, dawka jednorazowa (mg): 1 000 mg.

### Skład

Substancją czynną leku jest pyrantel.

5 ml zawiesiny doustnej zawiera 250 mg pyrantelu (w postaci pyrantelu embonianu).

Pozostałe składniki to: sodu benzoesan (E 211), karmeloza sodowa, sorbitol 70% (E 420), glicerol, glinu-magnezu krzemian, polisorbitat 80, powidon, aromat morelowy (zawiera etanol, glikol propylenowy, geraniol, alkohol benzylowy), emulsja symetykonu, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

### Przeciwwskazania

- Uczulenie na pyrantel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Jeśli pacjent przyjmuje piperazynę.
- Jeśli pacjent jest w trakcie leczenia miastenii (choroba mięśni szkieletowych).

### Działania niepożądane

Działania niepożądane:

- nudności, wymioty, zaburzenia łaknienia, bóle brzucha, biegunka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,
- alergiczne wysypki skórne,
- bóle i zawroty głowy, senność lub bezsenność.

### Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- W oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
- Po otwarciu lek można przechowywać przez 21 dni.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy omówić to z lekarzem: gdy dziecko jest w wieku poniżej 2 lat, jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby, jeśli pacjent jest niedożywiony lub ma niedokrwistość (anemię).

Jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą pacjenta aktualnie lub są związane z sytuacjami występującymi w przeszłości, należy skontaktować się z lekarzem.

- Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Lek może zwiększać stężenie teofiliny (stosowana w leczeniu astmy oskrzelowej) w osoczu. Leku nie należy stosować jednocześnie z piperazyną gdyż działanie obu leków może ulec osłabieniu.
- Ciąża i karmienie piersią: nie zaleca się stosowania tego leku w okresie ciąży. Jeśli leczenie jest konieczne, należy skontaktować się z lekarzem. Nie zaleca się stosowania także u kobiet karmiących piersią. Jeśli leczenie produktem jest konieczne, należy w tym czasie zaprzestać karmienia piersią.
- Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: brak danych dotyczących wpływu tego leku na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.
- Lek ten zawiera: sorbitol 70% (E 420), sodu benzoesan (E 211), sól, glicerol, etanol (z aromatu), geraniol (z aromatu), alkohol benzylowy (z aromatu), glikol propylenowy (z aromatu).

-

**Dodatkowe informacje**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.