

Pyrantelum Owix 250 mg, od 6 roku życia, 3 tabletki



Cena: 21,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	250 mg
Opakowanie	3 tabletki
Postać	tabletki
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Pyrantelum
Wiek	od 6 roku życia

Opis produktu

Opis

Pyrantelum jest lekiem przeciwpasożytniczym, przeznaczonym dla dzieci w wieku od 6 lat i dorosłych w leczeniu zakażenia jelitowego owsikami - robakami obłymi typu nicieni barwy białej. Lek ten działa na mięśnie pasożytów jelitowych. Unieruchomione pasożyty zostają usunięte z jelita wskutek ruchów perystaltycznych jelit. Pyrantel nie podrażnia jelit ani nie wywołuje przemieszczania się robaków. Działa na formy dojrzałe i pasożyty we wczesnym stadium rozwoju, natomiast nie działa na larwy w trakcie ich migracji w tkankach.

Wskazania

Owsica. Warunkiem zastosowania leku jest stwierdzenie występowania owsików w kale i (lub) okolicy odbytu.

Działanie

Przeciwpasożytnicze.

Dawkowanie

- Dawkę należy powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach od przyjęcia pierwszej dawki. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku.
- Po upływie 14 dni od zakończenia leczenia należy wykonać kontrolne badania parazytologiczne.
- Jeśli objawy utrzymują się po podaniu drugiej dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.
- Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby powinni przed przyjęciem leku skontaktować się z lekarzem.

Dawkowanie tabletek w zależności od masy ciała pacjenta:

- 17-28 kg: dawka jednorazowa: 1 tabletki (250 mg),
- 29-39 kg: dawka jednorazowa: 1½ tabletki (375 mg),
- 40-50 kg: dawka jednorazowa: 2 tabletki (500 mg),
- 51-62 kg: dawka jednorazowa: 2½ tabletki (625 mg),

- 63-75 kg: dawka jednorazowa: 3 tabletki (750 mg),
- Dorośli o mc. >75 kg: dawka jednorazowa: 4 tabletki (1 000 mg)

Lek stosuje się doustnie w czasie lub po posiłku popijając wodą. Przed połknięciem tabletkę należy bardzo dokładnie rozgryźć lub rozkruszyć.

Skład

- Substancją czynną leku jest pyrantel. Każda tabletkę zawiera 250 mg pyrantelu w postaci embonianu pyrantelu.
- Pozostałe składniki leku to: skrobia ziemniaczana, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, etyloceluloza, magnezu stearynian, aromat pomarańczowy.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na pyrantel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Jeśli pacjent przyjmuje piperazynę.
- Jeśli pacjent jest w trakcie leczenia miastonii (choroba mięśni szkieletowych).

Działania niepożądane

- Działania niepożądane występujące rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów): nudności, wymioty, bóle i skurcze żołądka, biegunki, brak łaknienia; bóle głowy, zawroty głowy, senność, bezsenność; wysypka; osłabienie; przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz (enzymów określających czynność wątroby).
- Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): parcie na stolec; omamy z dezorientacją, parestezje (uczucie drętwienia, mrowienia w kończynach); gorączka; zaburzenia słuchu.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy omówić to z lekarzem: jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby; jeśli pacjent jest niedożywiony lub ma niedokrwistość (anemię).
- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Lek może zwiększać stężenie teofiliny (stosowana w leczeniu astmy oskrzelowej) w osoczu. Leku nie należy stosować jednocześnie z piperazyną, gdyż działanie obu leków może ulec osłabieniu.
- Lek przyjmuje się w czasie lub po posiłku.
- Nie zaleca się stosowania tego leku w okresie ciąży i karmienia piersią. Jeśli leczenie jest konieczne, należy skontaktować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.