

Radirex Plus, syrop, na zaparcia, 125 g



Cena: 13,99 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	125 g
Opakowanie	125 g
Postać	syrop
Producent	WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Preparat ziołowy
Wiek	od 12 roku życia

Opis produktu

Opis

Radirex Plus, lek w postaci syropu o działaniu przeczyszczającym. Zawarte w korze kruszyny i korzeniu rzewienia pochodne 1,8 dihydroantracenu wywierają wpływ na czynność motoryczną okrężnicy, przyspieszają pasaż jelitowy, zmniejszają resorpcję płynów. Działanie przeczyszczające występuje w 6-8 godz. po przyjęciu leku.

Wskazania

Zaparcia.

Działanie

Przeczyszczające.

Dawkowanie

- Dorośli: 30 ml (2 łyżki stołowe) przed snem, tj. 25,4 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na glukofrangulinę A.
- Młodzież powyżej 12 lat: 10-15 ml (2 do 3 łyżeczek od herbaty) przed snem, tj. od 8,5 do 12,7 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na glukofrangulinę A.

Skład

100 g syropu zawiera:

Substancja czynna:

Wyciąg płynny (1:1) złożony z : korzenia rzewienia (*Rhei radice*), kory kruszyny (*Frangulae cortice*), owocu kopru włoskiego (*Foeniculi fructu*), owocu kminku (*Carvi fructu*) (5/4/0,5/0,5) -10,0 g

(ekstrahent: etanol 50% v/v)

Substancje pomocnicze: sacharoza, woda oczyszczona.

15 ml syropu (jedna łyżka stołowa) zawiera 12,7 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na glukofrangulinę A.
Syrop zawiera do 3,5% m/m etanolu.

Przeciwwskazania

- Nie zaleca się stosować u dzieci poniżej 12 lat.
- Nie należy stosować jeśli występuje: niedrożność jelit, atonia jelit, ostre i przewlekłe choroby zapalne jelit (m.in. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), zapalenie wyrostka robaczkowego, biegunka, odwodnienie i zaburzenia elektrolitowe, bóle brzucha o niejasnej etiologii,
- Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości – rzadko (rzadko (1/10 000 do <1/1000));

Zaburzenia żołądka i jelit:

- Ból brzucha, stany skurczowe jelit, płynny stolec (szczególnie u pacjentów z nadwrażliwym jelitem grubym) – częstość nieznana.
- Długotrwałe stosowanie leku może prowadzić do zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, białkomoczu i krwiomoczu.
- Długotrwałe stosowanie leku może powodować pigmentację śluzówki jelita (pseudomelansosis coli), która zwykle przemija po zakończeniu przyjmowania leku.
- Podczas leczenia może wystąpić żółte lub czerwono-brązowe (zależnie od odczynu pH) zabarwienie moczu spowodowane obecnością w nim metabolitów substancji czynnych, co nie jest istotne klinicznie.

Przechowywanie

- W temperaturze nie wyższej niż 25°C.
- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Ze względu na zawartość 12,4 g sacharozy w jednej łyżce stołowej syropu, leku nie powinni stosować chorzy na cukrzycę.
- W przypadku zastosowania u osób z chorobą hemoroidalną, szczelinami odbytu, po zabiegach operacyjnych okolic odbytu oraz w przypadku długotrwałego unieruchomienia zaleca się konsultację z lekarzem.
- Lek należy stosować w zaparciach wtedy, gdy zawodzi dieta i inne nefarmakologiczne sposoby leczenia.
- Nie należy stosować bez porady lekarza dłużej niż 1-2 tygodnie.
- Długotrwałe stosowanie produktu może doprowadzić do osłabienia perystaltyki jelit i do zakłócenia gospodarki wodno-elektrolitowej.
- Należy unikać stosowania leku podczas miesiączki.
- Produkt leczniczy zawiera do 3,5 % m/m etanolu (alkoholu), tzn. do 700 mg etanolu w jednej łyżce stołowej, co jest równoważne 14 ml piwa lub 5,8 ml wina.
- Leku nie należy stosować w czasie ciąży i karmienia piersią.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.