

Ranigast SOS Mleczko, od 6 roku życia, zawiesina doustna, 200 ml



Cena: 19,71 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	200 ml
Opakowanie	200 ml
Postać	zawiesina doustna
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Wiek	od 6 roku życia

Opis produktu

Opis

Ranigast SOS Mleczko, zawiesina doustna, zawiera połączenie kilku substancji działających synergistycznie w środowisku żołądka. Szczególny skład preparatu zawierającego: alginian sodu oraz wodorowęglan potasu i węglan wapnia umożliwia jego szybkie działanie. Preparat umożliwia zmniejszanie nadkwaśności, zapobiegając wystąpieniu uczucia pieczenia, bólu brzucha i niestrawności. Przynosi ulgę od przetyku do żołądka, łagodzi zgagę i ból w nadbrzuszu oraz zapobiega występowaniu niestrawności oraz pieczenia.

Zastosowanie

- Łagodzenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak: zgaga oraz ból brzucha.
- Wspomagająco u pacjentów z zapaleniem żołądka.

Zalecane spożycie

- Dorośli i młodzież (12–18 lat): 1 łyżka stołowa (około 15 ml) po dwóch głównych posiłkach w ciągu dnia i przed snem, do momentu ustąpienia objawów.
- Dzieci (9-12 lat): 2 łyżeczki (około 10 ml) po dwóch głównych posiłkach w ciągu dnia i przed snem do momentu ustąpienia objawów.
- Dzieci (6-9 lat): 1 łyżeczka (około 5 ml) po dwóch głównych posiłkach w ciągu dnia i przed snem do momentu ustąpienia objawów.

Jeśli po miesiącu stosowania produktu problem nadal występuje, należy skonsultować się z lekarzem.

Skład

Alginian sodu, węglan wapnia, wodorowęglan potasu.

Substancje pomocnicze: wyciąg z imbiru (aromat), olejek eteryczny z imbiru (aromat), aromaty anyżu i mleka, woda, karbomer,

parahydroksybenzoesan metylowo-sodowy, sukraloza.

Przechowywanie

- W suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła lub światła.
- W miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze od 15 do 25oC.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Kobiety w ciąży i karmiące piersią - stosowanie po konsultacji z lekarzem.
- Nie przyjmować w przypadku zdiagnozowanej nadwrażliwości na składniki produktu.
- Po zastosowaniu dawek niezbędnych do osiągnięcia efektu terapeutycznego jedynymi zgłaszanymi działaniami niepożądanymi mogą być zaparcie i przemijające nudności.
- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. U dzieci i młodzieży (6–18 lat) produkt można stosować tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne i po konsultacji z lekarzem.
- Nie przekraczać zalecanej dawki, ponieważ większe ilości mogą doprowadzić do zaparcia lub przemijającej biegunki.
- Stosowanie produktu jest przeciwwskazane w przypadku przewlekłych zaparć lub biegunki, choroby nerek lub przewlekłej niewydolności serca.
- Nie należy stosować produktu dłużej niż przez 30 kolejnych dni, jeśli objawy utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie przyjmować w przypadku nietolerancji produktu.

Dodatkowe informacje

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.