


Raphacholin C, 30 tabletek drażowanych



Cena: 16,62 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	30 tabletek drażowanych
Postać	tabletki drażowane
Producent	WROCLAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Produkt złożony

Opis produktu

Wskazania

Tradycyjnie stosuje się w niestrawności, dolegliwościach trawiennych związanych z dysfunkcją wątroby (wzdęcia, bóle brzucha, odbijania, nudności, zaparcia), zaburzeniach aktywności skurczowej pęcherzyka żółciowego.

Działanie

Żółciopędne i żółciotwórcze (wywiera bezpośredni wpływ na wątrobę, pobudza wydzielanie żółci). Regularne przyjmowanie preparatu pobudza wydzielania żółci co działa ochronnie na miąższ wątroby, przyspiesza eliminację z żółcią szkodliwych substancji i wzmacnia ruchy perystaltyczne jelit.

Dawkowanie

- Lek stosować doustnie.
- Dorośli - w niestrawności jednorazowo 1 do 3 tabletek, w innych dolegliwościach trawiennych przeciętnie 3 razy dziennie po 1 do 2 tabletek 30 minut po posiłku. W zaparciach 2 tabletki rano i wieczorem na ½ godziny przed jedzeniem.

Skład

Substancjami czynnymi leku są:

Wyciąg suchy z korzenia rzodkwi czarnej z węglem aktywnym (1:1) (Raphani sativi nigri radicis extractum siccum (DER natywny 30-42:1, ekstrahent: etanol 85% (v/v)) cum carbo activatus (1:1)) 150 mg, Wyciąg gęsty z ziela karczocha (Cynarae herbae extractum spissum (DER 2-4:1, ekstrahent: etanol 50% (v/v)) 47 mg, Kwas dehydrocholowy (Acidum dehydrocholicum) 40 mg, Olejek eteryczny miętowy (Menthae piperitae aetheroleum) 15 mg.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku,
- Ciężki choroby wątroby,
- Niedrożności dróg żółciowych i przewodu pokarmowego,
- Ostre i przewlekłe stany zapalne żołądka i jelit.
- W przypadku kamicy żółciowej lek stosować po konsultacji z lekarzem.

Działania niepożądane

Sporadycznie mogą wystąpić luźne stolce, kolka żółciowa oraz reakcje alergiczne na składniki leku. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy zaprzestać stosowania leku.

Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25°C.
- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Preparat zwiększa objętość wydzielanej żółci, dlatego u pacjentów z kamicią żółciową istnieje możliwość przesunięcia kamieni. Lek stosować po przeprowadzeniu indywidualnego rozpoznania stanu dróg żółciowych pacjenta.
- Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować produktu leczniczego.
- Nie stosować u dzieci poniżej 10 lat.
- Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- W dużych dawkach z lekami hipotensyjnymi (obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi) i moczopędnymi potencjalnie może powodować hipokaliemię.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.