

Raphacholin forte 250 mg, 10 tabletek powlekanych



Cena: 18,90 zł

Opis słownikowy

Dawka	250 mg
Opakowanie	10 tabletek powlekanych
Postać	tabletki powlekane
Producent	WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Acidum dehydrocholicum

Opis produktu

Wskazania

Lek stosuje się w niedostatecznym wydzielaniu żółci przez wątrobę i ni strawności objawiającej się wzdęciami, bólami brzucha, odbijaniem, nudnościami, zaparciami oraz jako łagodny środek przeczyszczający.

Działanie

Lek zawiera kompozycję kwasu dehydrocholowego z dodatkiem wyciągu z czarnej rzodkwi, o działaniu zwiększającym objętość wydzielanej żółci (żółciopędny) oraz przyspieszającym jej transport do dwunastnicy. Zwiększona ilość żółci pobudza pracę jelita grubego, dzięki czemu produkt posiada łagodne działanie przeczyszczające.

Dawkowanie

- Lek stosować doustnie.
- W przypadku ni strawności: dorośli 1 tabletkę po posiłku, w razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 3 tabletek na dobę.
- W przypadku zaparcia: dorośli 2 tabletki jednorazowo.
- Efekt przeczyszczający spodziewany jest do 6 godzin.

Skład

1 tabletkę powlekana zawiera

Substancja czynna: Kwas dehydrocholowy - 250 mg

Substancje pomocnicze:

wyciąg suchy z korzenia rzodkwi czarnej (10-15:1) (wyciąg natywny (20-30:1) 50 %, maltodekstryna 50 %, ekstrahent - woda) olejek eteryczny miętowy, celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymetyloskrobi, skrobia ziemniaczana, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, sodu laurylosiarczan, węgiel aktywny, powłoczka Aqua Polish black 081.06 o składzie: hypromeloza, laktoza jednowodna, talk, makrogol, tlenek żelaza czarny (E 172), indygotyna (E 132)

Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

- Jeśli występują: ostre i przewlekłe schorzenia wątroby, ostre stany zapalne w obrębie przewodu pokarmowego, niedrożność dróg żółciowych i przewodu pokarmowego.

Działania niepożądane

- Zaburzenia żołądka i jelit (biegunka, nudności, wymioty oraz inne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego) – częstość nieznana.
- Zaburzenia układu immunologicznego (reakcje alergiczne) – częstość nieznana.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.