

Rapidentin 1 ml/ml, płyn stomatologiczny, 5 ml



Cena: 19,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	1 ml/ml
Opakowanie	5 ml
Postać	płyn
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Szyzygium aromaticum

Opis produktu

Opis

Rapidentin to lek w postaci płynu stomatologicznego. Przeznaczony jest do tymczasowego łagodzenia bólu zęba. Płyn działa bezpośrednio na ząb, nakłada się go za pomocą nasączonego patyczka higienicznego na bolącą część zęba. Zabieg ten daje ulgę w bólu i pozwala dotrzeć do wizyty u stomatologa.

Wskazania

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do tymczasowego złagodzenia bólu zęba.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Działanie

Ulgę w bólu zęba.

Dawkowanie

- Dorośli i osoby w podeszłym wieku: wacik lub patyczek higieniczny należy nasączyć nierozcieńczonym lekiem i przyłożyć go do bolącej części zęba. Aplikację leku można powtórzyć po 20 minutach, a następnie co 2 godziny, jeśli to konieczne.

Unikać kontaktu z dziąsłami aby nie doszło do podrażnienia błony śluzowej.

- Leku nie stosować dłużej niż 7 dni. Należy zwrócić się do dentysty najszybciej jak to możliwe.

Skład

1 ml płynu zawiera 1 ml olejku eterycznego goździkowego (Caryophylli floris aetheroleum). Lek nie zawiera substancji pomocniczych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na balsam peruwiański.

Działania niepożądane

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): podrażnienie błony śluzowej, reakcje uczuleniowe (alergiczne).

Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25oC.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu: 3 miesiące.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Unikać kontaktu leku z dziąsłami.
- Nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.
- Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.