

Recigar 1,5 mg, na uzależnienie od nikotyny, 100 tabletek powlekanych



Cena: 58,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	1,5 mg
Opakowanie	100 tabletek powlekanych
Postać	tabletki powlekane
Producent	ADAMED PHARMA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Cytisinum

Opis produktu

Wskazania

Leczenie uzależnienia od nikotyny. Stosowanie leku jest wskazane w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Końcowym celem stosowania leku jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę.

Działanie

Odzwyczajanie się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Końcowym celem stosowania leku jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę.

Dawkowanie

- Jedno opakowanie leku (100 tabletek) wystarcza na pełną terapię. Czas leczenia to 25 dni.
- Na blistrze oznaczone są kolejne dni przyjmowania leku Recigar.
- Osoba paląca powinna całkowicie zrezygnować z palenia najpóźniej 5. dnia po rozpoczęciu leczenia. Osoba, która zrezygnowała z palenia, w żadnym przypadku nie może pozwolić sobie na zapalenie nawet jednego papierosa. Od tego zależy trwałość uzyskanego wyniku leczenia. Jeżeli rezultat terapii jest niezadowolający, należy przerwać leczenie i po upływie 2 do 3 miesięcy rozpocząć leczenie ponownie.
- Lek ten należy przyjmować doustnie z odpowiednią ilością wody zgodnie z następującym schematem:

Dni terapii	Dawkowanie	Maksymalna dawka dzienna
Od 1 do 3 dnia	1 tabletko co 2 godziny	6 tabletek
Od 4 do 12 dnia	1 tabletko co 2,5 godziny	5 tabletek
Od 13 do 16 dnia	1 tabletko co 3 godziny	4 tabletek
Od 17 do 20 dnia	1 tabletko co 5 godzin	3 tabletki
Od 21 do 25 dnia	1-2 tabletki na dobę	do 2 tabletek

Skład

- Substancją czynną leku jest cytyzyna. Każda tabletką zawiera 1,5 mg cytyzyny.
- Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: Hypromeloza, mannitol, skrobia kukurydziana, krzemian glinowo-magnezowy, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Skład otoczki: AquaPolish P green Project 16712 (hypromeloza (E464), celuloza mikrokrystaliczna (E460), talk (E553b), glicerol, tytanu dwutlenek (E171), lak żółcieni chinolinowej (E104), lak indygotyny (niebieski 2) (E132)], aromat mentolowy proszek (SC552873), aspartam E951].

Przeciwwskazania

- Uczulenie na cytyzynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- W przypadku niestabilnej dławicy piersiowej,
- W przypadku przebytego niedawno zawału mięśnia sercowego,
- W przypadku klinicznie istotnych zaburzeń rytmu serca,
- Niedawno przebyty udar mózgu,
- Okres ciąży i karmienia piersią.

Działania niepożądane

Częstość możliwych działań niepożądanych określono następująco: bardzo często (występują u więcej niż 1 osoby na 10), często (występują u 1 do 10 osób na 100), niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000), rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000), bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Bardzo często: zmiana apetytu (głównie zwiększenie), przyrost masy ciała, bóle głowy, rozdrażnienie, zaburzenia snu (bezsennność, senność, ospałość, dziwne sny, koszmary), zmiany nastroju, lęk, przyspieszenie akcji serca, suchość w jamie ustnej, bóle brzucha (głównie w nadbrzuszu), nudności, bóle mięśniowe.

- Często: zawroty głowy, trudności w koncentracji, zwolnienie akcji serca, wyżki ciśnienia tętniczego, wymioty, zmiany smaku, zaparcie, biegunka, wzdęcia, pieczenie języka, zgaga, wysypka, męczliwość, złe samopoczucie.
- Niezbyt często: uczucie ciężkości głowy, osłabienie popędu płciowego, łzawienie, duszność, wzmożone odkrztuszanie, nadmierne ślinienie, wzmożona potliwość, zmniejszenie elastyczności skóry, zmęczenie, wzrost aktywności aminotransferaz (enzymów wątrobowych).

Wymienione działania niepożądane występują głównie w początkowym okresie leczenia i ustępują wraz z jego trwaniem. Mogą być one również wynikiem zaprzestania palenia tytoniu (objawy odstawienia), a nie przyjmowania leku Recigar.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.