

Rekord Łuszczy 200 mg/ g, maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry, 15 g



Cena: 7,50 zł

Opis słownikowy

Dawka	200 mg/ g
Opakowanie	15 g
Postać	maść
Producent	WYTWÓRNIA FARMACEUTYCZNA FARMAL
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Acid.salicylic.

Opis produktu

Wskazania

Usuwanie odcisków oraz zgrubień skóry u osób dorosłych.

Działanie

Kwas salicylowy stosowany miejscowo na zrogowaciały naskórek działa złuszcząco, zmiękcza i rozpułchnia naskórek, ułatwiając jego złuszczenie

Dawkowanie

- Przed rozpoczęciem leczenia nogi należy dobrze wymoczyć w ciepłej wodzie. Następnie należy nałożyć maść na odcisk i zabezpieczyć plastrem. Należy codziennie uzupełniać ubytek maści zachowując ostrożność tak, aby nie dostała się na zdrową skórę. Leczenie trwa tydzień. Po upływie tego czasu nogi należy ponownie dobrze wymoczyć. Odcisk powinien dać się łatwo usunąć. W ten sam sposób leczy się zgrubiałą skórę.
- W przypadku bardzo zasterzałych zmian, leczenie należy powtórzyć. Nie stosować leku dłużej niż przez 2 tygodnie.

Skład

1 g maści zawiera substancję czynną: kwas salicylowy 200 mg.

Substancja pomocnicza: wazelina żółta.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na kwas salicylowy, salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- U pacjentów z cukrzycą lub z zaburzeniami układu krążenia;
- Jeśli skóra w okolicy odcisku (lub zgrubienia skóry) jest zraniona lub zmieniona zapalnie;
- Na zmiany o dużej powierzchni;
- Do oczu;

- Na skórę twarzy, pachwin;
- W okolicy odbytu i narządów płciowych;
- Na błony śluzowe;
- U dzieci.

Działania niepożądane

Lek może powodować miejscowe podrażnienie skóry, stan zapalny skóry, odczyny alergiczne i nadmierne wysuszenie skóry. Zastosowanie leku na skórę zdrową, duże powierzchnie skóry lub błony śluzowe może powodować objawy podrażnienia w postaci rumienia. W przypadku przewlekłego stosowania leku mogą wystąpić ogólne działania niepożądane kwasu salicylowego.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25°C.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 2 lata.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.