

# Remifemin, 100 tabletek



Cena: 69,99 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	100 tabletek
Postać	tabletki
Producent	SCHAPER & BRUMMER GMBH & CO. KG
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Cimicifugae racemosae extr.fluidum (0,78-1,14:1) isopropanolicum 40% (v/v)

## Opis produktu

### Opis

Remifemin, lek w postaci tabletek. Zawiera płynny wyciąg z kłącza pluskwicy groniastej (Cimicifugae racemosae rhizoma). Remifemin jest lekiem roślinnym łagodzącym dolegliwości w okresie menopauzy.

### Wskazania

Środek łagodzący dolegliwości okresu menopauzy takie jak przyływy uczucia gorąca i nadmierne pocenie się.

### Działanie

Łagodzące dolegliwości w okresie menopauzy.

### Dawkowanie

- Dorosłe kobiety: 2 razy dziennie po 1 tabletkę (jedna tabletkę rano i jedna wieczorem).
- Tabletki należy połykać w całości popijając odpowiednią ilością płynu.
- Efekty działania leku nie pojawiają się natychmiast. Pierwsze terapeutyczne efekty pojawiają się po dwóch tygodniach przyjmowania leku. Wskazane jest stosowanie leku Remifemin przez kilka miesięcy, jednak przyjmowanie leku dłużej niż 6 miesięcy wymaga konsultacji z lekarzem.

### Skład

Substancją czynną jest wyciąg z kłącza pluskwicy groniastej - Cimicifugae racemosae rhizomae extractum fluidum (0,78 – 1,14:1) isopropanolicum 40% (V/V).

1 tabletkę zawiera 0,018-0,026 ml tego wyciągu.

Pozostałe składniki to: celaktoza (celuloza sproszkowana i laktoza jednowodna), skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, olejek miętowy.

### Przeciwwskazania

Uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

### Działania niepożądane

- Rzadko ( $\geq 1/10\ 000$  do  $< 1/1\ 000$ ): zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (niestrawność, biegunka), skórne reakcje alergiczne (pokrzywka, swędzenie, wysypka), obrzęk twarzy i obrzęki obwodowe, przyrost masy ciała.
- Nie jest znana (nie można określić na podstawie dostępnych danych): odnotowano przypadki hepatotoksyczności (w tym zapalenie wątroby, żółtaczka, nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych) produktów zawierających pluskwicę (Cimicifuga).

### Przechowywanie

W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność i omówić z lekarzem:

- jeśli u pacjentki stwierdzono zaburzenia czynności wątroby. W takim przypadku należy wykonać testy czynnościowe wątroby.
- jeśli pojawią się objawy sugerujące uszkodzenie wątroby (zmęczenie, utrata apetytu, żółknięcie skóry i oczu, silny ból w górnej części brzucha, nudności, wymioty, ciemne zabarwienie moczu).

W takim przypadku należy zaprzestać przyjmowania leku Remifemin i niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

- jeśli wystąpi krwawienie z dróg rodnych lub inne niepokojące objawy. Należy skonsultować się z lekarzem w celu wyjaśnienia ich przyczyny.
- jeśli pacjentka przyjmuje estrogeny. O zastosowaniu leku Remifemin jednocześnie z estrogenami może zdecydować wyłącznie lekarz.
- jeśli pacjentka była wcześniej leczona lub obecnie jest leczona w związku z nowotworem piersi lub innymi nowotworami zależnymi od hormonów.

Jeśli którykolwiek z wymienionych przypadków dotyczy pacjentki, należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania leku.

- Lek nie ma zastosowania u mężczyzn.
- Lek nie ma zastosowania u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat.
- Inne leki i Remifemin: interakcje z innymi lekami nie są znane. Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio.
- Lek ten z jedzeniem, pić i alkoholem: nie są znane interakcje
- Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność: bezpieczeństwo stosowania tego leku w czasie ciąży i karmienia piersią nie zostało ustalone. Nie należy przyjmować leku w okresie ciąży i karmienia piersią. Wpływ leku na płodność nie jest znany. Kobiety w wieku rozrodczym powinny rozważyć stosowanie skutecznej antykoncepcji.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

- Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: badania wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn nie były przeprowadzone.
- Lek zawiera laktozę: jeśli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.