

Reparil 20 mg, 40 tabletek dojelitowych



Cena: 32,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	20 mg
Opakowanie	40 tabletek dojelitowych
Producent	MADAUS GMBH
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Escinum

Opis produktu

Wskazania

Obrzęki po miejscowych urazach.

Skład

Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg beta-escyny (Escinum).

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, powidon (K 29-32), magnezu stearynian.

Skład otoczki: sacharoza, talk, guma arabska, tytanu dwutlenek (E 171), krzemionka koloidalna bezwodna, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (Eudragit L 100-55), makrogl 8000, sodu wodorotlenek, karmeloza sodowa, trietylu cytrynian, symetykon emulsja, wosk biały, wosk Carnauba

Stosowanie

Dorośli i młodzież od 14 lat: 2 tabletki 3 razy na dobę,
w lekkich przypadkach i jako dawka podtrzymująca: 1 tabletki 3 razy na dobę;
Dzieci i młodzież: dzieci od 7 do 14 lat: 1 tabletki 2 lub 3 razy na dobę.
Przyjmować po posiłku, połykając tabletkę w całości i popijając wodą.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na escynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
Dzieci w wieku poniżej 7 lat.
Niewydolność lub zaburzenia czynności nerek.
Cięża i okres karmienia piersią.

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

