

Reparil Gel N (0,01 g + 0,05 g)/ g, żel, 40 g



Cena: 32,95 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Cena jednostkowa | 40 g |
| Dawka | (0,01 g + 0,05 g)/ g |
| Opakowanie | 40 g |
| Postać | żel |
| Producent | MADAUS GMBH |
| Rejestracja | Lek |
| Substancja czynna | Escinum, Diethylamini salicylas |

Opis produktu

Wskazania

Miejscowo w leczeniu wspomagającym w celu złagodzenia dolegliwości pourazowych takich jak:

- stłuczenia,
- zgniecenia,
- krwiaki,
- urazy stawów.

Skład

100 g żelu zawiera: Beta - Escynę (Escinum) 1 g, Salicylan dietyloaminy (Diethylamini salicylas) 5 g.

Substancje pomocnicze: olejek lawendowy, olejek kwiatu pomarańczy, karbomer (kwas poliakrylowy), makrogol 6 (Softigen 767), wersenian disodowy, trometamol, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

W temperaturze poniżej 25°C.

Stosowanie

Nanieść i rozprowadzić na chore miejsce oraz jego okolice 1 do 3 razy na dobę, do ustąpienia objawów, tj. 1 do 2 tygodni, chyba, że lekarz zaleci inaczej.

Przeciwwskazania

Uczulenie na salicylany, escynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Gdy u pacjenta występują otwarte rany.

Nie należy stosować leku na błony śluzowe, obszary skóry poddane napromienianiu.

I trymestr ciąży.

Jeżeli u pacjenta występuje przewlekła choroba nerek, niewydolność nerek.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.