

Respero Myrtol 300 mg, 50 kapsułek dojelitowych, miękkich



Cena: 58,45 zł

Opis słownikowy

Dawka	300 mg
Opakowanie	50 kapsułek dojelitowych, miękkich
Postać	kapsułki dojelitowe miękkie
Producent	G.POHL-BOSKAMP GMBH & CO.KG
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Destylat z mieszan.rektyf.ol.eterycz.eukal.,po mar.sł.,mirtu zw.i cytryny zw.

Opis produktu

Wskazania

Łagodzenie objawów ostrego zapalenia górnych dróg oddechowych.

Działanie

Rozluźnia śluz i ułatwia oczyszczanie ze śluzu, czyniąc go łatwiejszym w odkrztuszeniu oraz zmniejsza stan zapalny.

Dawkowanie

- W ostrych stanach zapalnych dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat powinni przyjmować jedną kapsułkę 3-4 razy na dobę. Czas stosowania powinien wynosić od 3 do 5 dni. Jeśli po upływie tego czasu nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.
- Kapsułki leku należy przyjmować bez rozgryzania, na około 30 minut przed posiłkiem, z dużą ilością płynu. Ostatnia dawka może zostać przyjęta przed snem.

Skład

- Substancją czynną leku jest destylat z mieszaniny rektyfikowanych olejków eterycznych eukaliptusowego, pomarańczy słodkiej, mirtu zwyczajnego i cytryny zwyczajnej.

Jedna kapsułka zawiera 300 mg destylatu z mieszaniny rektyfikowanych olejków eterycznych: Eucalyptus globulus Labill. aetheroleum (eukaliptusowy olejek eteryczny), Citrus sinensis L. aetheroleum (pomarańczy słodkiej olejek eteryczny), Myrtus communis L. aetheroleum (mirtu zwyczajnego olejek eteryczny) i Citrus limon L. aetheroleum (cytryny zwyczajnej olejek eteryczny).

- Pozostałe składniki to: olej rzepakowy, rafinowany, żelatyna, glicerol 85% (E 422), hypromelozy octano-bursztynian, trietylu cytrynian, sorbitol ciekły, niekryształujący (E 420), kwas solny (13%), sodu laurylosiarczan, talk, dekstryna, amonowy glicerynian.

Przeciwwskazania

- Stany zapalne żołądka, jelit lub dróg żółciowych lub jeśli pacjent cierpi z powodu ciężkiej choroby wątroby,
- Uczulenie na olejek eukaliptusowy, olejek z pomarańczy słodkiej, olejek mirtowy, olejek cytrynowy lub cyneol (główny składnik olejku eukaliptusa) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

- Niezbyt często (występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000) mogą wystąpić przypadki dolegliwości żołądkowo-jelitowych, np. ból brzucha/uczucie dyskomfortu w nadbrzuszu, jak i rzadkie przypadki nudności, wymiotów lub biegunki.
- Rzadko (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000) zgłaszano wystąpienie reakcji nadwrażliwości (np. wysypka skórna, świąd, obrzęk twarzy, duszność lub zaburzenia krążenia krwi).
- W bardzo rzadkich przypadkach (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000), jakiegokolwiek kamienie obecne w nerkach lub drogach żółciowych mogą ulec przemieszczeniu.

Przechowywanie

- W temperaturze nie wyższej niż 25°C.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Respero Myrtol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- Jeśli objawy choroby utrzymują się lub ulegną pogorszeniu, lub jeśli wystąpi duszność lub gorączka lub jeśli pacjent rozpocznie odkrztuszanie śluzu zawierającego krew lub wydzielinę ropną, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
- Pacjenci chorujący na astmę oskrzelową, koklusz lub inne schorzenia układu oddechowego, którym towarzyszy znaczna nadwrażliwość układu oddechowego, powinni przyjmować Respero Myrtol wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Kapsułki leku zawierają nie więcej niż 50 mg sorbitolu na kapsułkę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.