

Reumaherb 100 mg, 30 tabletek powlekanych

Cena: 14,99 zł



Opis słownikowy

Dawka	100 mg
Opakowanie	30 tabletek powlekanych
Postać	tabletki powlekane
Producent	POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Rejestracja	Lek
Wiek	od 18 roku życia

Opis produktu

Wskazania

Dolegliwości bólowe w schorzeniach zwyrodnieniowych narządu ruchu.

Działanie

Zmniejszenie dolegliwości bólowych w schorzeniach zwyrodnieniowych narządu ruchu.

Dawkowanie

- Dorośli : 3 razy dziennie po 1 tabletkę w chorobach przewlekłych, o ile lekarz nie zaleci inaczej.
- Leku nie stosować dłużej niż 10 dni.

Skład

1 tabletkę zawiera:

substancje czynne:

1 tabletkę zawiera 100 mg wyciągu suchego złożonego (2-4:1) z Harpagophytum precumbens, L., radix (korzenia diabelskiego pazura), Echinacea purpurea, L., herba (ziela jeżówki), Filipendula ulmariae L., flos (kwiat wiązówki) (4/3/3), ekstrahent: etanol 50%(V/V).

substancje pomocnicze: laktoza, skrobia ziemniaczana, mieszanina laktozy, powidonu i krospowidonu, powidon, magnezu stearynian, celuloza mikrokryształiczna, hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek E171, czerwien koszenilowa lak E 124, indygotyna lak E132.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancję czynną, na salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- Uczulenie na rośliny z rodziny Asteraceae (dawniej Compositae),
- Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy oraz postępujące choroby układu.

Działania niepożądane

Wystąpić mogą między innymi: reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, zespół Stevensa-Johnsona, obrzęk naczynioruchowy skóry, obrzęk Quinckego, skurcz oskrzeli z ich obstrukcją, astma oraz wstrząs anafilaktyczny). U chorych uczulonych istnieje ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej po zastosowaniu preparatów

z jeżówki. Odnotowano związek między stosowaniem preparatów z jeżówki z zachorowaniem na choroby o podłożu autoimmunologicznym, takie jak rozlane zapalenie mózgu, rumień guzowaty, immunotrombocytopenia, zespół Evansa, zespół Sjogrena z zaburzeniem funkcji nerkowych cewek zbiorczych. Po długotrwałym stosowaniu (powyżej 8 tygodni) może wystąpić leukopenia. Częstość występowania ww. zaburzeń jest nieznaną. W trakcie stosowania możliwe jest także wystąpienie łagodnych zaburzeń żołądkowo-jelitowych.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- W przypadku kamicy żółciowej przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.
- Lek zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.