

# Rivel 5 mg/ g, żel odkażający, 30 g



Cena: 24,90 zł

## Opis słownikowy

Cena jednostkowa	30 g
Dawka	5 mg/g
Opakowanie	30 g
Postać	żel
Producent	ICN POLFA RZESZÓW S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Ethacridini lactas

## Opis produktu

### Wskazania

Miejscowo:

- w odkażaniu skóry i błon śluzowych;
- we wspomagającym leczeniu zakażeń skóry wywołanych głównie przez bakterie Gram-dodatnie (czyraki, czyraki mnogie, ropnie), mieszanych zapaleń skóry (bakteryjnych i grzybiczych);
- po ukąszeniu owadów.

### Działanie

Przeciwbakteryjne, jednocześnie łagodzi dolegliwości bólowe i stan zapalny.

### Dawkowanie

- Stosować miejscowo na skórę lub błony śluzowe.
- Nakładać ciekłą warstwę leku na zmienioną chorobowo skórę lub błony śluzowe 2-3 razy na dobę (w razie potrzeby częściej). Lek może być stosowany pod opatrunek.
- Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, jeśli leczenie ich nie dotyczy.
- Czas trwania leczenia zależy od rodzaju i nasilenia zmian chorobowych. Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

### Skład

Substancją czynną leku jest mleczan etakrydyny 5 mg/g.

Pozostałe składniki to: etanol 96%, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, hydroksyetyloceluloza, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

### Przeciwwskazania

Uczulenie na mleczan etakrydyny, inne pochodne akrydyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

#### **Działania niepożądane**

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób) może wystąpić miejscowe podrażnienie skóry (rumień, pieczenie, świąd, wysypka) oraz miejscowe odczyny alergiczne.

#### **Przechowywanie**

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
- Chronić od światła.

#### **Ostrzeżenia i środki ostrożności**

- Jeśli wystąpią objawy podrażnienia lub zmiany na skórze, należy zaprzestać stosowania leku. Jeśli objawy te utrzymują się, należy zgłosić się do lekarza. Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.
- Należy unikać kontaktu leku z oczami. W razie przedostania się żelu do oczu, należy go usunąć obficie spłukując wodą.
- Nie stosować na duże powierzchnie uszkodzonej skóry.
- Nie należy stosować na błonę śluzową jamy ustnej.
- Jeśli lek został omyłkowo spożyty, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Należy unikać kontaktu leku z odzieżą (możliwość powstania plam, przebarwień). W celu usunięcia powstałych plam, użyć alkoholu lub roztworu 6% octu z gorącą wodą zmieszanych w stosunku 1,5 do 1. W przypadku trudnych do usunięcia plam, dodać łyżkę stołową 3% wody utlenionej do opisanego wyżej roztworu.
- Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

#### **Dodatkowe informacje**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.