

Rostil Max 500 mg, 30 tabletek



Cena: 24,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	500 mg
Opakowanie	30 tabletek
Postać	tabletki
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Calcii dobesilas

Opis produktu

Opis

Rostil jest lekiem w postaci tabletek. Zawiera substancję czynną wapnia dobezytan jednowodny, która działa na nabłonek naczyń włosowatych, ściany żył oraz naczynia limfatyczne. Lek zmniejsza przepuszczalność naczyń włosowatych, zwiększa ich wytrzymałość zapobiegając tworzeniu wysięków i usprawniając mikrokrążenie. Lek zwiększa napięcie ściany żył co zapobiega powstawaniu zastojów i zakrzepów w naczyniach żylnych. Nasila syntezę kolagenu, zmniejsza lepkość osocza zwiększając jego przepływ przez tkanki obwodowe.

Wskazania

Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (żylaki): ból, kurcze, mrowienie, obrzęk, zmiany skórne na tle zastoi krwi.

Działanie

Lek działa uszczelniająco na naczynia w obrębie układu limfatycznego powodując zmniejszenie obrzęków, co prowadzi do ustąpienia dolegliwości bólowych i uczucia ciężkości kończyn.

Dawkowanie

- Dorośli od 500 mg do 1000 mg na dobę, tj. 2 tabletki 1 – 2 razy na dobę.
- Lek należy przyjmować podczas posiłku.

Skład

Substancją czynną leku jest wapnia dobezytan jednowodny. Jedna tabletkę zawiera 500 mg wapnia dobezytanu jednowodnego. Pozostałe składniki: celuloza mikrokryształiczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

- Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek;
- Jeśli pacjent ma przewlekłe nawracające nieżytowe zapalenie żołądka;

- Jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.