

Rowachol, 50 kapsułek miękkih



Cena: 26,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	50 kapsułek miękkih
Postać	kapsułki miękkie
Producent	ROWA-WAGNER GMBH AND CO. KG
Rejestracja	Lek

Opis produktu

Opis

Rowachol, lek w postaci kapsułek miękkih. Stosowany w kamicy żółciowej oraz dolegliwościach wątrobowych. Zwiększa rozpuszczanie i ułatwia eliminację kamieni żółciowych. Poprawia rozpuszczalność cholesterolu w żółci. Pobudza wydzielanie żółci i zmniejsza jej zastój.

Wskazania

- Leczenie i profilaktyka kamicy żółciowej oraz dolegliwości dróg żółciowych (stany skurczowe, dyskineza).
- Przed i po zabiegach w obrębie dróg żółciowych (w zespole po cholecystektomii).

Działanie

- Rozkurczowe.
- Żółciopędne.

Dawkowanie

- 30 minut przed posiłkiem.
- Dorośli: 1 kapsułka 3-4 x dziennie.
- Dzieci od 6 do 14 lat: 1 kapsułka 1-2 x dziennie.

Skład

1 kapsułka miękka zawiera: substancje czynne: alfa-pinen 13,6mg, beta-pinen 3,4mg, camphen 5,0mg, cineol 2,0mg, menthon 6,0mg, menthol 32,0mg, borneol 5,0mg oraz substancje pomocnicze: oliwa z oliwek 33mg. Powłoczka kapsułki: żelatyna, glicerol 85%, hydroksybenzoesan etylu (sól sodowa), hydroksybenzoesan propylu (sól sodowa), wodny roztwór miedziowego kompleksu chlorofilu (E141).

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
- Nie stosować w I trymestrze ciąży i okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

- Występują bardzo rzadko, obejmują odbijania i uczucie miętowego smaku po jedzeniu. Objawy te można zredukować lub zlikwidować stosując preparat na czczo, 30 minut przed jedzeniem.
- W pojedynczych przypadkach donoszono o bolesności ust i owrzodzeniu błony śluzowej jamy ustnej, przerwanie leczenia powoduje szybkie zniknięcie powyższych działań niepożądanych.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.