

## Rowatinex, 30 kapsułek miękkih



Cena: 17,00 zł

### Opis słownikowy

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Opakowanie        | 30 kapsułek miękkih         |
| Postać            | kapsułki miękkie            |
| Producent         | ROWA-WAGNER GMBH AND CO. KG |
| Rejestracja       | Lek                         |
| Substancja czynna | Produkt złożony             |
| Wiek              | od 18 roku życia            |

### Opis produktu

#### Wskazania

Pomocniczo w przypadku stwierdzenia małych złogów kamieni nerkowych (tzw. piasku nerkowego).

#### Działanie

Moczopędnie oraz łagodnie rozkurczająco na drogi moczowe.

#### Dawkowanie

Dorośli: 1 kapsułka 3-4 x dziennie, 30 minut przed posiłkiem.

#### Skład

1 kapsułka zawiera substancje czynne: Alfa - pinenum - 24,8 mg, Beta - pinenum - 6,2 mg, Camphenum - 15,0 mg, Cineolum - 3,0 mg, Fenchonum - 4,0 mg, Borneolum - 10,0 mg, Anetholum - 4,0 mg  
Substancje pomocnicze: olej z oliwek - 33,0 mg,  
Powłoczka kapsułki: żelatyna wołowa, glicerol 85%, etylu parahydroksybenzoesan (E 214), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), żółcień pomarańczowa FCF 85% (E 110), żółcień chinolinowa WS 70% (E 104).

#### Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku.
- Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

#### Działania niepożądane

U niewielkiej liczby pacjentów występowały lekkie, przejściowe zaburzenia żołądkowe. W rzadkich przypadkach występowały wymioty. W dwóch przypadkach stwierdzono nietolerancję leku (z nieznanej przyczyny) - działania niepożądane występowały rzadko i miały niewielkie znaczenie.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek nie jest przeznaczony dla chorych z ostrą kolką nerkową, bezmoczem lub ciężkimi zakażeniami dróg moczowych.

**Dodatkowe informacje**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.