

Rubital 1,73 g/ 5 ml, syrop, 125 g



Cena: 12,90 zł

Opis słownikowy

Dawka	1,73 g/5ml
Opakowanie	125 g (but.szkl.barw.z miarką)
Postać	syrop
Producent	GEMI P.P.F. GRZEGORZ NOWAKOWSKI
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Althaeae radicis maceratio

Opis produktu

Wskazania

Objawy podrażnień błony śluzowej jamy ustnej i gardła oraz związany z tym suchy kaszel.

Działanie

- Wodny wyciąg (macerat) z korzenia prawoślazu lekarskiego stosuje się tradycyjnie na błonę śluzową jamy ustnej i gardła jako lek osłaniający, chroniący przed objawami podrażnienia. Zastosowanie to związane jest z zawartością śluzu roślinnego z korzenia prawoślazu oraz jego lepkością. Śluz korzenia prawoślazu tworzy roztwory koloidalne, które pokrywają błony śluzowe cienką warstwą i działają na nie ochronnie. Ponadto śluz, działa osłaniająco na zmienioną błonę śluzową gardła oraz łagodzi kaszel.

Dawkowanie

- Nie należy stosować dłużej niż tydzień.
- Stosować doustnie, za pomocą dołączonej do opakowania miarki.
- Dzieci w wieku 1-3 lat: z zalecenia lekarza 2,5 ml, dawkę powtórzyć w zależności od nasilenia objawów podrażnienia do 4 razy dziennie.
- Dzieci w wieku 3-6 lat: 5 ml, dawkę powtórzyć w zależności od nasilenia objawów podrażnienia do 4 razy dziennie.
- Dzieci w wieku 6-12 lat: 5 ml, dawkę powtórzyć w zależności od nasilenia objawów podrażnienia do 5 razy dziennie.
- Młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 10 ml, dawkę powtórzyć w zależności od nasilenia objawów podrażnienia od 3 do 5 razy dziennie.

Skład

Substancją czynną leku jest macerat z korzenia prawoślazu lekarskiego. 100 g leku zawiera 26,6 g maceratu z 2 g *Althaea officinalis* L., radix (korzenia prawoślazu lekarskiego), DER (1:20), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda z etanolem (39 + 1). Substancja pomocnicza:

benzoesan sodu 200 mg

Ponadto lek zawiera: sacharozę, sodu benzoesan, syrop malinowy (skład: sok z malin, sacharozę).

Zawiera małą ilość etanolu (do 0,7% m/m).

Przeciwwskazania

- Uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
- Uczulenie na kwas benzoesowy i jego pochodne.

Działania niepożądane

- U osób szczególnie wrażliwych na sodu benzoesan może wystąpić pobudzone wydzielanie śliny i podrażnienie żołądka.
- Przy zbyt częstym dawkowaniu syropu, powyżej zatwierdzonego schematu dawkowania, może dochodzić do działania przeczyszczającego.

Przechowywanie

- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25oC. Chronić od światła.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

U dzieci w wieku 1-3 lat zastosowanie leku powinno odbywać się za zgodą lekarza i pod kontrolą lekarską. Nie podawać niemowlętom, które nie ukończyły jeszcze 1. roku życia (12 miesięcy).

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.