

## Sapoven T (20 mg + 10 mg)/ g, żel, 30 g



Cena: 14,95 zł

## Opis słownikowy

Cena jednostkowa	30 g
Dawka	(20 mg + 10 mg)/ g
Opakowanie	30 g
Postać	żel
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Troxeutinum, Hippocastani seminis extractum siccum
Wiek	od 18 roku życia

## Opis produktu

**Wskazania**

Lek stosuje się w przewlekłej niewydolności żylniej, w tym:

- w leczeniu zaburzeń krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych (z objawami obrzęków, uczuciem świądu),
- w dolegliwościach związanych z żylakami i w stanach przedżylakowych,
- pomocniczo w obrzękach pourazowych oraz po zabiegach chirurgicznych.

**Działanie**

Działa przeciwobrzękowo, uszczelniająco i tonizująco na żyły, poprawia stan śródbłonek naczyń włosowatych zmniejszając ich przepuszczalność i łamliwość.

**Dawkowanie**

- Lek stosuje się miejscowo na skórę.
- Dorośli: wcierać żel 2 do 3 razy na dobę w zmienione chorobowo miejsce.
- Równoczesne stosowanie leków doustnych, zawierających te same substancje czynne co ten lek należy skonsultować z lekarzem.

**Skład**

- Substancjami czynnymi leku są trokserutyna oraz glikozydy trójterpenowe w przeliczeniu na bezwodną escynę pozyskane z zagęszczonego wyciągu z nasion kasztanowca *Aesculus hippocastanum* L.

Jeden gram żelu zawiera:

- 20 mg trokserutyny (Troxerutinum),
- 100 mg zagęszczonego wyciągu z nasion kasztanowca *Aesculus hippocastanum* L. (*Hippocastani semen extractum*), zawierającego 10 mg glikozydów trójterpenowych w przeliczeniu na bezwodną escynę (DER 4:1; ekstrahent: etanol 80%).
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: glikol propylenowy, trometamol, karbomer, metylu parahydroksybenzoesan, aromat cytrynowy, propylu parahydroksybenzoesan, disodu edetynian, woda oczyszczona.

#### Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- W przypadku otwartych, rozległych ran i uszkodzonej skóry,
- Ze względu na obecność parahydroksybenzoesanu metylu i propylu nie należy stosować leku u osób z alergią na parabeny.

#### Działania niepożądane

Podczas stosowania może wystąpić przemijające uczucie ciepła i podrażnienie skóry, u osób nadwrażliwych może wystąpić pokrzywka.

#### Przechowywanie

- W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.