

Sapoven T 200 mg + 20 mg, 48 kapsułek miękkih



Cena: 21,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	200 mg + 20 mg
Opakowanie	48 kapsułek miękkih
Postać	kapsułki miękkie
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Troxeutinum, Hippocastani seminis extractum siccum
Wiek	od 18 roku życia

Opis produktu

Wskazania

W objawach przewlekłej niewydolności żylnych kończyn dolnych np. przy uczuciu bólu, obrzęku nóg, nocnych kurczach łydek, uczuciu ciężkości nóg.

Działanie

Lek wpływa na napięcie naczyń żylnych, zmniejsza ich przepuszczalność, usprawnia krążenie żylnie, zapobiega zastojom żylnym, działa przeciwobrzękowo i przeciwwysiękowo.

Dawkowanie

- Stosować doustnie.
- Dorośli: 1 kapsułka 3 razy na dobę podczas posiłku.
- Zalecany okres stosowania wynosi od 3 do 4 tygodni, przy czym lekarz może zalecić kontynuowanie terapii.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są trokserutyna (Troxeutinum) i suchy wyciąg z nasion kasztanowca (Hippocastani semen extractum siccum).

1 kapsułka zawiera 200 mg trokserutyny oraz 105,3 mg wyciągu suchego z nasion kasztanowca, co odpowiada 20 mg glikozydów trójterpenowych w przeliczeniu na bezwodną escynę (5-7:1), ekstrahent: etanol 80% (V/V).

- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: olej sojowy oczyszczony, olej palmowy rafinowany, olej kokosowy uwodorniony, wosk żółty, lecytyna sojowa, żelatyna, glicerol, tytanu dwutlenek (E171), tlenek żelaza brązowy (E172), tlenek żelaza żółty (E172).

Przeciwwskazania

- Uczulenie na trokserutynę, wyciąg z nasion kasztanowca lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- W razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję.

Działania niepożądane

W rzadkich przypadkach może wystąpić podrażnienie błony śluzowej żołądka (objawiające się np. nudnościami), które ustępuje, jeżeli lek jest przyjmowany podczas posiłków, a także napadowe zaczerwienienie twarzy, bóle głowy i wysypka.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- W przypadku stanu zapalnego skóry, zapalenia żył, podskórnego stwardnienia, silnego bólu, wrzodów, nagłego obrzęku jednej lub obu nóg, niewydolności serca lub nerek, należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie zaleca się samodzielnego stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.
- Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych.
- Z uwagi na zawartość escyny zachować ostrożność przy stosowaniu leku jednocześnie z lekami nefrotoksycznymi. Escyna może zwiększać ryzyko krwawienia przy jednoczesnym stosowaniu z pochodnymi kumaryny, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i heparyną.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.