

Saridon 250 mg + 150 mg + 50 mg, 20 tabletek

Cena: 29,90 zł



Opis słownikowy

Dawka	250 mg + 150 mg + 50 mg
Opakowanie	20 tabletek
Postać	tabletki
Producent	BAYER SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Paracetamol, Propyphenazon, Coffeinum

Opis produktu

Wskazania

- Ból głowy, ból zęba, ból miesiączkowy, ból pooperacyjny, ból reumatyczny.
- Ból i gorączka związane z przeziębieniem i gripą.

Działanie

Przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mała dawka kofeiny, nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.

Dawkowanie

- Dorośli: 1-2 tabletki,
- Młodzież w wieku 12-16 lat: 1 tabletką.

Jeśli istnieje konieczność, dawkę można powtórzyć do trzech razy na dobę.

Tabletki należy popić dużą ilością wody lub innego płynu.

Leku nie należy przyjmować dłużej niż jeden tydzień ani w dawkach większych niż zalecane.

Skład

Substancjami czynnymi leku jest są: paracetamol, propyfenazon, kofeina.

Inne składniki leku to: hypromeloza, celuloza mikrokryształiczna, esma-spreng, skrobia kukurydziana, talk, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Przeciwwskazania

- Uczulenie (nadwrażliwość) na propyfenazon, paracetamol, kofeinę lub którykolwiek z pozostałych składników,
- Uczulenie na pirazolony lub pochodne tych związków (nadwrażliwość na fenazon, aminofenazon, metamizol),
- Uczulenie na fenylbutazon lub kwas acetylosalicylowy,

- Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej,
- Choroba alkoholowa,
- Ciężka niewydolność wątroby (w skali Child-Pugh > 9),
- Ciężka niewydolność nerek,
- Ostra porfiria wątrobowa,
- Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Działania niepożądane

- Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Zgłaszano pojedyncze przypadki małopłytkowości (zmniejszenie liczby płytek krwi), leukopenii (obniżenie liczby krwinek białych), plamicy małopłytkowej, agranulocytozy (zmniejszenie liczby granulocytów – jednego z rodzajów białych krwinek) i pancytopenii (niedobór wszystkich prawidłowych elementów morfotycznych krwi, tj. krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi) związane ze stosowaniem paracetamolu i propyfenazonu.

- Zaburzenia żołądka i jelit

Mogą również wystąpić zaburzenia żołądka i jelit (pieczenie, nudności, wymioty, niepokój w żołądku, biegunka, ból brzucha).

- Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niewydolność wątroby, zapalenie wątroby, jak również zależna od dawki niewydolność wątroby, martwica wątroby (w tym ze skutkiem śmiertelnym).

Przewlekłe niekontrolowane stosowanie może prowadzić do zwłóknienia wątroby, marskości wątroby (w tym zakończonej zgonem).

- Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje alergiczne, reakcje nadwrażliwości, reakcje anafilaktyczne i wstrząs anafilaktyczny (ostra, zagrażająca życiu reakcja alergiczna).

- Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, senność.

- Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Uszkodzenie nerek, zwłaszcza w przypadku przedawkowania.

- Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Skurcz oskrzeli, duszność, astma.

- Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk alergiczny i obrzęk naczyńnioruchowy, ostre uogólnione wysypki, wysypka polekowa, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa Johnsona, martwica toksyczna – rozplywna naskórka (w tym zakończona zgonem).

Kofeina stosowana w dużych dawkach może wpływać niekorzystnie na serce powodując: kołatanie serca, nagłe zaczerwienienie, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, częstoskurcz.

Przechowywanie

- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 30°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie

stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.