

# Scopolan 10 mg, 6 czopków doodbytniczych



Cena: 15,25 zł

## Opis słownikowy

Dawka	0,01 g
Opakowanie	6 czopków doodbytniczych
Producent	WROCLAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Hyoscine butylbromide

## Opis produktu

### Wskazania

Dolegliwości bólowe w stanach skurczowych: układu moczowo – płciowego (np. kolka nerkowa, stany skurczowe związane z kamicą moczowodową, bolesne miesiączkowanie), dróg żółciowych (np. kolka żółciowa), przewodu pokarmowego (np. skurcze żołądka, kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego).

### Działanie

Złagodzenie bolesnych skurczy przewodu pokarmowego, dróg żółciowych oraz układu moczowo – płciowego.

### Dawkowanie

Rozerwać trójkątny koniec folii, wyjąć czopek z blistra i wprowadzić do odbytnicy.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: doodbytniczo 1 do 2 czopków 2 do 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: doodbytniczo 1 czopek 2 do 3 razy na dobę.

Zawsze należy stosować najmniejszą dawkę skuteczną. Jeśli objawy będą się utrzymywać dłużej niż 3 dni od rozpoczęcia leczenia lub nasilią się mimo stosowania leku, pacjent powinien przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.

### Skład

Substancja czynna: butylobromek hioscyny – 10 mg

Substancje pomocnicze: polisorbat 80, parafina ciekła, woda oczyszczona, tłuszcz stały.

### Przeciwwskazania

- Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu,
- Uczulenie na substancję czynną – butylobromek hioscyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- Jeśli występuje: uczulenie na alkaloidy tropanowe (np. atropinę) i ich pochodne, zaparcia atoniczne, jaskra z wąskim kątem przesączania (choroba oczu przebiegająca ze wzrostem ciśnienia śródgałkowego), rozrost prostaty (gruczołu krokowego), zwężenie szyi pęcherza moczowego, niedrożność porażenna jelit (zatrzymanie procesu przemieszczania się treści jelitowej), zwężenie przełyku, wpustu lub odźwiernika żołądka, patologiczne poszerzenie jelita grubego (megacolon), tachykardia

(zaburzenia rytmu serca przebiegające z przyspieszeniem czynności serca), nużliwość mięśni (myasthenia gravis) (choroba przebiegająca z upośledzeniem funkcji i znacznym osłabieniem mięśni).

**Przechowywanie**

W temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**Dodatkowe informacje**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.