

Scorbolamid Extra Hot, 8 saszetek

Cena: 14,95 zł



Opis słownikowy

Dawka	(300 mg + 300 mg + 50 mg + 5 mg)/saszetkę
Opakowanie	8 saszetek
Postać	granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Salicylamidum, Acidum ascorbicum, Rutosidum, Zincum

Opis produktu

Wskazania

Gorączka i objawy związane z przeziębieniem lub grypą, bóle głowy, wspomaganie odporności organizmu w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C i cynk oraz uszczelnianie naczyń włosowatych.

Działanie

- Salicylamid - działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie.
- Rutozyd – pobudza układ odpornościowy i wspiera organizm w walce z infekcją wirusową. Zwiększa wchłanianie witaminy C, a także przedłuża jej działanie.
- Kwas askorbowy (witamina C) - uzupełnia niedobór witaminy C, wspomaga organizm przy infekcjach wirusowych i bakteryjnych. Wpływa na procesy związane z odpornością.
- Cynk – uzupełnia niedobór cynku, wspomaga odporność organizmu.

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat: 1 saszетка 3 razy na dobę. Wysypać zawartość jednej saszетки leku do pół szklanki ciepłej wody i dokładnie zamieszać. Wypić natychmiast zawiesinę powstałą po rozpuszczeniu granulatu. Granulat nie ulega całkowitemu rozpuszczeniu.
- Lek przyjmować po posiłku.
- Należy stosować najmniejsze skuteczne dawki. Leczenie objawowe bez porady lekarskiej należy prowadzić najkrócej jak to możliwe.
- Jeśli objawy nie ustąpią po 3-5 dniach leczenia lub nasilą się (nawet przed upływem tego czasu) należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Skład

Substancjami czynnymi leku są salicylamid, kwas askorbowy, rutozyd i cynk.

Każda saszетка zawiera 300 mg salicylamidu, 300 mg kwasu askorbowego, 50 mg rutozydu oraz 5 mg cynku w postaci glukonianu

cynku.
Pozostałe składniki to: mannitol SD100, mannitol M100, hydroksypropyloceluloza, kwas cytrynowy bezwodny, aromat cytrynowy, sukraloza, krzemionka koloidalna bezwodna.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na salicylamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- Uczulenie na niesteroidowe leki przeciwzapalne;
- Astma z polipami nosa;
- Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy i (lub) stany zapalne przewodu pokarmowego;
- Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (cukrzyca, mocznica, tężyczka);
- Zaburzenia krzepliwości krwi (np. hemofilia, trombocytopenia);
- Genetycznie uwarunkowany niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej;
- Kamica nerkowa;
- Hemochromatoza (cukrzyca brązowa), niedokrwistość syderoblastyczną, nadmierną ilość kwasu moczowego we krwi lub szczawianów w moczu;
- Ciężka niewydolność serca;
- Ciąża i okres karmienia piersią;
- Jeśli pacjent stosuje jednocześnie lek metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych;
- Dzieci i młodzież w wieku poniżej 16 lat, (poza rzadkimi chorobami, takimi jak np. choroba Kawasaki), ze względu na możliwość wystąpienia zespołu Reye'a, rzadkiej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.