


Sebidin 5 mg + 50 mg, 20 tabletek do ssania

Cena: 14,31 zł



Opis słownikowy

Dawka	5 mg + 50 mg
Opakowanie	20 tabletek do ssania
Postać	tabletki do ssania
Producent	OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Chlorhexidinum, Acidum ascorbicum

Opis produktu

Wskazania

- Lek uzupełnia zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C występujące w stanach zapalnych błony śluzowej gardła i krtani.
- W miejscowym leczeniu objawów zapalenia błony śluzowej gardła i krtani.

Działanie

- Chlorheksydyny dichlorowodorek wykazuje działanie przeciwbakteryjne: działa bakteriostatycznie i bakteriobójczo wobec bakterii Gram-dodatnich, Gram-ujemnych oraz drożdżaków *Candida albicans*.
- Witamina C bierze udział w procesie tworzenia kolagenu i regeneracji tkanek.

Dawkowanie

- Zalecana dawka, to 1 tabletkę 4 razy na dobę (co 6 godzin).
- Dzieci i młodzież w wieku od 12 lat i dorosłych pacjentów: na śluzówkę jamy ustnej. Ssać 1 tabletkę 4 razy na dobę (co 6 godzin).
- Ze względu na zawartość sacharozy wskazana jest ostrożność podczas podawania osobom z cukrzycą oraz z tendencją do próchnicy.
- Lek zaleca się stosować po posiłku i oczyszczeniu zębów.
- Przez 2 godziny po zastosowaniu leku nie zaleca się płukania jamy ustnej lub picia dużej ilości płynów.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: chlorheksydyny dichlorowodorek oraz kwas L-askorbowy (witamina C). Jedna tabletkę zawiera 5 mg chlorheksydyny dichlorowodoru oraz 50 mg kwasu askorbowego.

Pozostałe składniki to: sacharoza, metyloceluloza, talk, magnezu stearynian, żółcień chinolinowa (E104), czerwien koszenilowa (E124), aromat landrynkowy.

Przeciwwskazania

Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

- Niekiedy mogą wystąpić: reakcje alergiczne (wysypki na skórze, powierzchniowe złuszczenie się nabłonka błony śluzowej jamy ustnej, obrzęk ślinianek przyusznych); podrażnienie lub zapalenie błony śluzowej jamy ustnej; podrażnienie żołądka i biegunka.
- Stosowanie powyżej 7 dni może spowodować działania niepożądane w postaci przebarwień grzbietu języka, powierzchni zębów i uzupełnień z materiałów złożonych z akrylanów, które ustępują samoistnie.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25 °C.
- W oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.
- Gdy lekarz zaleci kontynuację leczenia, nie należy stosować leku dłużej niż 14 dni bez ponownej konsultacji z lekarzem.
- Lek może powodować zaburzenia smaku, które zwykle ustępują po 4 godzinach od zastosowania.
- Podczas długotrwałego stosowania mogą wystąpić przebarwienia zębów i języka, które ustępują samoistnie lub muszą być usunięte przez lekarza.
- W pojedynczych przypadkach u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego i wątroby mogą wystąpić zaburzenia żołądka i jelit tj. nudności, wymioty, odbijanie. W tych przypadkach należy przerwać stosowanie leku.
- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Nie stwierdzono oddziaływania tego leku z innymi lekami.
- Lek zaleca się stosować po spożyciu pokarmu.
- W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
- Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.