

Sebidin Intensive 5 mg + 5 mg, bez cukru, 20 tabletek do ssania



Cena: 21,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	5mg+5mg
Opakowanie	20 tabletek do ssania
Postać	tabletki do ssania
Producent	PERRIGO POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Chlorhexidini dihydrochloridum, Benzocainum

Opis produktu

Wskazania

Lek jest lekiem przeznaczonym do leczenia objawów, takich jak: ból i podrażnienie gardła, bezgłos, towarzyszących zakażeniom jamy ustnej i gardła przebiegającym bez gorączki. Ponadto może być stosowany w leczeniu stanów zapalnych błony śluzowej dla których charakterystyczne są drobne owrzodzenia błony śluzowej (afty).

Dawkowanie

Zalecana dawka to: 1 tabletkę co 2 godziny. W ciągu doby można przyjąć maksymalnie 8 tabletek.

Skład

Substancjami czynnymi leku są chloroheksydyny dichlorowodorek oraz benzokaina.

Jedna tabletkę zawiera 5 mg chloroheksydyny dichlorowodoru i 5 mg benzokainy.

Pozostałe składniki to: manitol, celuloza mikrokrystaliczna (PH 101), powidon K29/32, magnezu stearynian, sodu cyklaminian (E 952), sodu sacharynian (E 954), aromat mentolowy 611072E, aromat pomarańczowy 90103-71.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- Dzieci w wieku poniżej 12 lat;
- U pacjentów chorych na methemoglobinemę (chorobę krwi związaną z powstaniem nieprawidłowej hemoglobiny, niezdolnej do przyłączania i przenoszenia tlenu. Najczęstszym jej objawem jest sinica, powstająca w wyniku niedotlenienia tkanek).

Działania niepożądane

- Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów): podrażnienie czubka języka i błony śluzowej jamy ustnej.
- Działanie niepożądane, których częstości występowania nie można określić na podstawie dostępnych danych:

methemoglobinemia (choroba krwi związana z występowaniem nieprawidłowej hemoglobiny); reakcje alergiczne dotyczące skóry i błony śluzowej; utrata apetytu; zaburzenia smaku (rzadko trwałe); zaburzenia oddychania, przekrwienie błony śluzowej nosa, podrażnienie gardła; brązowe przebarwienie zębów, języka, nudności, niestrawność, ból brzucha, biegunka, suchość

w jamie ustnej, pieczenie języka, mrowienie języka, zwiększone odkładanie się kamienia nazębnego; wysypka, pokrzywka, kontaktowe zapalenie skóry, alergiczne zapalenie skóry; brązowe przebarwienie wypełnień dentystycznych, protez dentystycznych i innych aparatów stosowanych w jamie ustnej.

Brązowe przebarwienia mogą być bardziej wyraźne u pacjentów, u których występuje kamień nazębny i pojawia się zwykle po tygodniu od rozpoczęcia leczenia. Przebarwienie języka nie jest groźne i zwykle ustępuje samoistnie. Przebarwienie zębów nie jest trwałe i może zostać usunięte podczas higieny jamy ustnej. Przebarwienie wypełnień dentystycznych może być trwałe.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów:

- z nietolerancją estrowych środków miejscowo znieczulających (zwłaszcza pochodnych kwasu para-aminobenzoowego, PABA), parabenów lub p-fenylendiaminy, gdyż mogą one wykazywać nadwrażliwość na benzokainę.
- w podeszłym wieku, ciężko chorych lub osłabionych ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych benzokainy.
- ciężkim urazem błony śluzowej jamy ustnej, ze względu na zwiększone wchłanianie środka znieczulającego.
- z zapaleniem przyzębia ze względu na zwiększone odkładanie kamienia naddziąsłowego.
- u których wypełnienie zęba jest szorstkie lub o nierównych brzegach ze względu na możliwość jego odbarwienia.
- Dzieci i młodzież: nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.
- Sebidin Intensive a inne leki: należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie stosować leku Sebidin Intensive wraz z: innymi lekami zawierającymi substancje bakteriobójcze (np. z sulfonamidami); inhibitorami cholinesterazy (lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń poznawczych).

- Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność: jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Ze względu na ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią nie zaleca się stosowania leku Sebidin Intensive w tej grupie pacjentów.
- Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.
- Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w tabletkę, to znaczy lek uznaje się za "wolny od sodu".

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.