

## SeptaNazal dla dzieci, aerozol, 10ml



**Szybko udrażnia nos  
Regeneruje śluzówkę**

Cena: 13,19 zł

### Opis słownikowy

Dawka	0,5 mg+50 mg w 1 ml
Opakowanie	10ml
Postać	aerozol do nosa, roztwór
Producent	KRKA D.D. NOVO MESTO
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Xylometazolini hydrochloridum, Dexpanthenolum
Wiek	od 2 roku życia

### Opis produktu

#### Wskazania

Dla dzieci od 2 do 6 roku życia jest wskazany:

- w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej w nieżyty nosa oraz w leczeniu uszkodzeń błony śluzowej nosa,
- w leczeniu niealergicznego zapalenia błony śluzowej (naczynioruchowego nieżyty nosa),
- w leczeniu niedrożności przewodów nosowych po przebytej operacji nosa.

#### Działanie

- Chlorowoderek ksylometazoliny ma działanie obkurczające naczynia krwionośne nosa i zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa oraz ilość wydzieliny. W ten sposób łagodzi uczucie zatkanego nosa.
- Dekspantenol jest pochodną witaminy, kwasu pantotenowego, posiadającego właściwości wspomagania gojenia się ran oraz ochronne nabłonka błony śluzowej nosa.

#### Dawkowanie

- Zalecana dawka: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego do trzech razy na dobę, w razie potrzeby. Dawkowanie zależy od indywidualnej wrażliwości pacjenta i

odpowiedzi klinicznej.

- Nie należy stosować dłużej niż 7 dni, chyba, że lekarz zaleci inaczej. Ponowne stosowanie jest możliwe tylko po kilkudniowej przerwie.

#### Skład

- Substancjami czynnymi leku są ksylometazoliny chlorowoderek oraz deksopantenol.

- Jedna dawka aerozolu do nosa zawiera 0,05 mg ksylometazoliny chlorowodoru i 5,0 mg deksopantenolu.
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: potasu diwodorofosforan, disodu fosforan dwunastowodny, woda oczyszczona.
- Nie zawiera substancji konserwujących.

### Przeciwwskazania

- Uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub deksopantenol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Jeśli u pacjenta występuje suche zapalenie błony śluzowej nosa z tworzeniem się strupów (rhinitis sicca).
- U pacjentów po zabiegach chirurgicznych usunięcia przysadki mózgowej lub innych operacjach przebiegających z odsłonięciem opon mózgowych (wyściółki mózgu).
- Dzieci poniżej 2 roku życia.

### Działania niepożądane

- Niezbyt często: mogą wystąpić do 1 na 100 osób: reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypka, świąd, obrzęk skóry i błon śluzowych.
- Rzadko: mogą wystąpić do 1 na 1000 osób: - kołatanie serca (uczucie bicia serca), tachykardia (przyśpieszenie akcji serca), nadciśnienie tętnicze (wysokie ciśnienie krwi).
- Bardzo rzadko: mogą wystąpić do 1 na 10000 osób: niepokój, bezsenność, zmęczenie (senność, sedacja), ból głowy, omamy (głównie u dzieci), zaburzenia rytmu serca (arytmie), obrzęk błony śluzowej jamy nosowej (po zaprzestaniu leczenia), krwawienie z nosa, napady padaczkowe (drgawki, szczególnie u dzieci).
- Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): pieczenie lub suchość błony śluzowej nosa, kichanie.

### Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

## Galeria

