

Septinum Silver Spray Kids, od 2 roku życia, 30 ml



Cena: 19,99 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	30 ml
Opakowanie	30 ml
Postać	spray
Producent	N.P.ZDROVIT SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Wiek	od 2 roku życia

Opis produktu

Opis

Septinum Silver Spray Kids, wyrób medyczny przeznaczony dla dzieci od 2. roku życia z nanosrebrem i wyciągiem z porostu islandzkiego. Preparat stosowany jest wspomagająco w leczeniu stanów zapalnych gardła, spowodowanych przez infekcje bakteryjne i wirusowe.

Wyrób łagodzi towarzyszące stanom zapalnym podrażnienia gardła, które objawiają się bólem, pieczeniem, uczuciem suchości i trudnościami w przełykaniu. Ponadto wytworzony film zabezpiecza przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych (takich jak suche lub zimne powietrze), wspomagając przywrócenie równowagi i odzyskanie przez błonę śluzową pierwotnej funkcji ochronnej. Dodatkowo spray wykazuje działanie nawilżające i odświeżające błonę śluzową jamy ustnej i gardła.

Zastosowanie

Wspomagająco w leczeniu:

- zapalenia gardła,
- zapalenia jamy ustnej,
- zapalenia migdałków podniebiennych,
- stanie po usunięciu migdałków podniebiennych.

Sposób użycia

- Stosować 3-4 razy dziennie po 3-4 dawki spray'u.
- Każdorazowo przed użyciem wyrobu medycznego zdjąć nasadkę ochronną. Przed pierwszym użyciem nowej butelki, po zdjęciu nasadki, kilkakrotnie nacisnąć dozownik, aż do pojawienia się roztworu. Końcówkę dozownika wprowadzić do ust tak, aby rozpylany roztwór powlekał tylną ścianę gardła. Trzymając butelkę pionowo, nacisnąć dozownik, co spowoduje łagodne podanie dawki roztworu.
- Aby zapewnić pełną skuteczność preparatu, nie należy pić ani jeść przez co najmniej godzinę po zastosowaniu spray'u.
- Czas stosowania zależy od okresu utrzymywania się dolegliwości, jednak nie powinien być dłuższy niż 7 dni.
- Stosować pod kontrolą osoby dorosłej.

Skład

Woda, gliceryna, ekstrakt glikolowo-wodny z szałwii, suchy ekstrakt z porostu islandzkiego (4:1), nanosrebro (5 ppm), polisorbat 80, aromat truskawkowy, benzoesan sodu, sorbinian potasu, kwas cytrynowy.

Przechowywanie

- W temperaturze pokojowej. Chronić od światła.
- W miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie należy stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
- Nie stosować u osób ze stwierdzoną alergią na srebro metaliczne.
- Nie stosować u dzieci poniżej 2. roku życia.
- Unikać kontaktu z oczami.
- W razie wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zaprzestać stosowania.
- Nie należy używać po upływie terminu ważności.