

Septolete Junior 1,2 mg, smak czereśniowy, 18 pastylek do ssania



Cena: 14,99 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Dawka | 1,2 mg |
| Opakowanie | 18 pastylek do ssania |
| Postać | pastylki do ssania |
| Producent | KRKA D.D. NOVO MESTO |
| Rejestracja | Lek |
| Substancja czynna | Cetylpyridinium |
| Wiek | od 4 roku życia |

Opis produktu

Wskazania

W miejscowym leczeniu lekkich zakażeń jamy ustnej i gardła (zapalenie gardła, zapalenie krtani, początkowy okres zapalenia migdałków podniebiennych).

Działanie

Miejscowo odkażające. Środek odkażający - chlorek cetylopirydyniowy działa bakteriobójczo. Działa również na niektóre wirusy i grzyby.

Dawkowanie

- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 8 pastylek na dobę. Należy ssać 1 pastylkę co 2 do 3 godzin.
- Dzieci w wieku powyżej 4 lat: zaleca się do 4 pastylek na dobę.
- Dzieci w wieku od 10 do 12 lat: do 6 pastylek na dobę.
- Pastylkę należy ssać co 3 do 4 godzin. Nie należy zażywać leku bezpośrednio przed lub w czasie jedzenia.

Skład

- Substancją czynną leku jest cetylopirydyniowy chlorek. Każda pastylka zawiera 1,2 mg cetylopirydyniowego chlorku.
- Pozostałe składniki leku to: maltitol płynny (sucha masa), maltitol, mannitol, lewomentol, olejek cytrynowy, aromat dzikiej czereśni, barwnik naturalny czerwony (Koszenila, E 120), glicerol, olej rycynowy, krzemionka koloidalna bezwodna, stearynian magnezu, tytanu dwutlenek (E 171), powidon, Capol 600.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość (uczulenie) na chlorek cetylopirydyniowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

- Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

Działania niepożądane

- Rzadko mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak: nudności, biegunka, przede wszystkim w przypadku stosowania leku w dawkach większych niż zalecane.
- W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, takie jak podrażnienie i wysypka.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu. Chronić przed światłem i wilgocią.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.